

PABRON S TABLETS

- ◆PABRON S TABLETS 含有保護氣管黏膜成分鹽酸溴克辛及維生素 C（以抗壞血酸鈣添加）等 7 種有效成分，有效緩解痰、喉嚨疼痛等 11 種感冒症狀的感冒藥。
- ◆無咖啡因，易吞服的小顆錠劑。
- ◆5 歲以上兒童可服用，適合作為家庭常備藥。

療效

緩和感冒的各種症狀（咳嗽、痰、喉嚨疼痛、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、畏寒（發燒造成的寒感）、發燒、頭痛、關節疼痛、肌肉痛）

用法及用量

請盡量於餐後 30 分鐘內以冷水或微溫水服用以下用量。

成人（15 歲以上），1 次 3 片，1 天 3 次

11 歲~14 歲，1 次 2 片，1 天 3 次

5 歲~10 歲，1 次 1 片，1 天 3 次

未滿 5 歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色等影響品質）

成分

3 片中

鹽酸溴克辛 4mg

氫溴酸右美沙芬 16mg

鹽酸消旋甲基麻黃鹼 20mg

乙醯胺酚 300mg

縮水蘋果酸氯芬尼拉明 2.5mg

抗壞血酸鈣（維生素 C 鈣） 83.3mg（9 片中 250mg）

核黃素（維生素 B₂） 4mg

添加劑

二氧化矽，纖維素，磷酸氫鈣，羥丙基纖維素，交聯羧甲基纖維素鈉，硬脂酸鎂，阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物）

注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響，無須擔憂。

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

- 下列的人請勿服用
 - 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
 - 曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥，引發氣喘的人。
- 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品
 - 其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）
- 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等）
- 服用前後請勿飲酒
- 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
 - 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
 - 孕婦或可能懷孕的人。
 - 正在哺乳的人。
 - 年長者。
 - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

發高燒，排尿困難

接受過下列診斷的人。

甲狀腺功能障礙，糖尿病，心臟病，高血壓，肝臟病，腎臟病，胃潰瘍、十二指腸潰瘍，青光眼

- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：發疹、發紅，發癢

消化器官：噁心、嘔吐、食慾不振

精神神經系統：頭暈

呼吸器官：氣短，呼吸困難

泌尿器官：排尿困難

其他：過度的體溫低下

- 極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼分泌物、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣泛性發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小疹子（小膿疱）、全身倦怠、食慾不振等症狀持續或急劇惡化。

藥物過敏症候群：皮膚廣泛性發紅，出現全身發疹、發燒、倦怠感、淋巴結（頸部、腋下、腹股溝等）腫大等。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食慾不振等。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適，暈眩、血尿等。

無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

口乾，嗜睡

- 即使服用 5～6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- ・請蓋緊瓶蓋並保管於避免陽光直射，濕氣較少的陰涼處。
- ・請置於兒童無法觸及之處保管。
- ・請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- ・請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。（為確保品質）

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- ・本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- ・多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- ・多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- ・供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。