

2019年7月

大正製薬株式会社

## パブロンせき止め液 使用上の注意改訂のお知らせ

本製品の使用上の注意を下記のとおり改訂いたします。

つきましては、改訂内容をご確認いただき、本製品の適正使用をお願い申し上げます。

### 記

#### <改訂内容>

改訂前	改訂後（___：改訂箇所）
「してはいけないこと」 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等） 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります） 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 4. 過量服用・長期連用しないでください	「してはいけないこと」 <u>1. 次の人は服用しないでください</u> <u>12歳未満の小児。</u> 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等） 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります） 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください <u>5. 過量服用・長期連用しないでください</u>

※この製品には12歳未満の小児の用法・用量はありません。

以上