

PABRON COUGH SUPPRESSANT SOLUTION

指定第二類醫藥品
鎮咳藥

◆百保能止咳糖漿為滋潤受損喉嚨，抑制惱人咳嗽、痰涎症狀的止咳藥。■不含具提神效果的咖啡因，即使咳嗽持續而無法入眠的夜間仍適合服用。■甜度適中，易於飲用的糖漿藥劑。

療效或效果

咳嗽、痰涎

用法及用量

請使用附上的刻度量杯量度以下用量，1天3次餐後或餐前服用。並且，睡前可再服用1次。需要時1天最多可服用6次，但請每隔大約4小時服用。

成人（15歲以上），1天3次，1次10mL

12歲～14歲，1天3次，1次6mL

未滿12歲：請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

蓋上瓶蓋前請以清潔紗布等將瓶口藥劑擦拭乾淨。（藥液乾燥可能造成瓶蓋不易扭開）

本劑為含天然藥材成分的口服液，如有沉澱屬正常現象。請充分搖勻後再行服用。

成分及分量

60mL中

Dihydrocodeine Phosphate 30mg

dl-Methylephedrine Hydrochloride 50mg

Chlorpheniramine Maleate 8mg

Guaifenesin 200mg

Platycodon Root Fluid Extract 0.8g

Cherry bark Root Fluid Extract 1.2g

添加劑

citric acid, Sodium citrate, Sodium Fumarate, Sugar, D-Sorbitol, Glucose, Butyl parahydroxybenzoate, Sodium benzoate, Sodium metaphosphate, Caramel, Anhydrous ethanol, flavor, Glycerin, Vanillin,

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

符合下列情形者請勿服用

未滿12歲的兒童。

服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

其他鎮咳祛痰藥、感冒藥、鎮靜藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）

●服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等。）

哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

●請勿過量服用、長期連續服用

諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

老年人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

發高燒

排尿困難

接受過下列診斷的人。

心臟病

高血壓

糖尿病

青光眼

甲狀腺功能障礙

呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸中止症、肥胖症

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

消化器官：

噁心

嘔吐

食欲不振

精神神經系統：

頭暈

泌尿器官：

排尿困難

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。

無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

呼吸障礙：出現氣短、呼吸困難等

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
便秘、嗜睡

口乾

●即使服用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。（為確保品質）

51

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。