

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	パブロンせき止めトリプル錠
2	成分・分量	1錠中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 15mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 3mg メトキシフェナミン塩酸塩 37.5mg トラネキサム酸 70mg
3	用法・用量	次の量を1日3回食後及び必要に応じて就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。 成人(15才以上) 1回1錠 15才未満 服用しないこと
4	効能・効果	のどの痛みをともなうせき・たん
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 4. 過量服用しないでください 5. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎)、血栓症を起こすおそれのある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。