

PABRON NASAL SPRAY

第二类医药品
滴鼻液

◆喷雾式Pabron滴鼻药剂的雾状颗粒会均匀地到达鼻子深处，其有效成分会迅速发挥作用，抑制鼻粘膜的炎症而改善鼻塞等症状。■包装为带盖容器，携带方便。

效能或效果

缓解急性鼻炎、过敏性鼻炎或鼻窦炎引起的下述各种症状：鼻塞、鼻涕（鼻涕过多）、打喷嚏、头重（头部沉重）

用法及用量

向鼻腔内1次各1~2喷。使用间隔为3个小时以上，1天最多可以使用6次。
成年人（15岁以上）以及7岁以上的儿童
向左右鼻腔内各1~2喷。
1天不超过6次
未满7岁，不宜使用
请严格遵守规定的用法用量。
如果过量使用，反而有可能导致鼻子堵塞。
儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
仅限作为鼻子喷剂使用。

成分及分量

100mL中
Naphazoline Hydrochloride 0.05g
Chlorpheniramine Maleate 0.5g
Benzethonium chloride 0.02g

添加剂

Glycerin

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）
●不要长期连续服用

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
孕妇或有其可能性的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
接受以下诊断的人群
高血压
心脏病
糖尿病
甲状腺功能障碍
青光眼
使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者
皮肤：
起疹、发红
发痒
鼻子：
红肿
刺激感
使用3天左右仍不见症状改善时，请停止使用，并咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
请勿与其他人共用
请勿服用超过使用期限的产品。
且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任