

パブロン点鼻

◆スプレー式パブロン点鼻は霧状の微粒子が鼻の奥深くまで均一に広がり、有効成分がすばやく作用し、鼻粘膜の炎症をおさえて鼻づまり等を改善します。●キャップ付き容器なので、携帯に便利です。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

用法・用量

1回に1～2度ずつ鼻腔内に噴霧します。なお、3時間以上の間隔をおいて、1日6回まで使用できます。

成人（15才以上）及び7才以上の小児

1～2度ずつ鼻腔内に噴霧します

1日6回まで

7才未満、使用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

点鼻用のみ使用してください。

成分及び分量

100mL中

ナファゾリン塩酸塩 0.05g

クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g

ベンゼトニウム塩化物 0.02g

添加物

グリセリン

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 長期連用しないこと

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の診断を受けた人。

高血圧

心臓病

糖尿病

甲状腺機能障害

緑内障

使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

鼻：

はれ

刺激感

3日間位使用しても症状の改善がみられない場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

他の人と共用しないでください

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。