

PABRON S GOLD W TABLETS

- ◆PABRON S GOLD W TABLETS 은 암브록솔염산염, L-카르보시스테인을 비롯해 6 가지 종류의 유효성분을 배합하여 목 통증, 기침, 콧물 등 11 개 감기 각종 증상에 효과가 있는 감기약입니다.
- ◆가정의 상비약으로 사용하십시오.

효능

감기의 각종 증상 (목의 통증, 기침, 콧물, 코막힘, 재채기, 가래, 두통, 발열, 오한, 관절통, 근육통) 의 완화

용법 및 용량

다음의 양을 식후 가급적 30 분 이내에 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

- 15 세 이상, 1 회 2 정, 1 일 3 회
- 12 세~14 세, 1 회 1 정, 1 일 3 회
- 12 세 미만, 복용하지 말 것

주의

- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.
- 젖은 손 등으로 만진 정제는 병에 다시 넣지 마십시오. (변색 등의 원인이 되며, 품질이 변할 수 있습니다)

성분

In 2 tablets

- 암브록솔염산염 15mg
- L-카르보시스테인 250mg
- 디히드로코데인 인산염 8mg
- 아세트아미노펜 300mg
- 클로르페니라민말레산염 2.5mg
- 리보플라빈 (비타민 B₂) 4mg

첨가물

셀룰로오스, 무수 규산, 인산수소칼슘, 전분글리콜산나트륨, 하이드록시프로필셀룰로오스, 경화유, 마그네슘스테아레이트

주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 비타민 B₂가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어나기 쉽습니다)

- 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오
본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
본제 또는 다른 감기약, 해열 진통제를 복용해 천식을 일으킨 적이 있는 사람.
12 세 미만의 소아.
- 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 사용하지 마십시오
다른 감기약, 해열 진통제, 진정제, 진해 거담제, 항히스타민제를 함유하는 내복약 등(비염용 내복약, 멀미약, 알레르기용 약 등)
- 복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 마십시오
(졸음 등이 나타날 수 있습니다)
- 수유 중인 사람은 본제를 복용하지 않거나 본제를 복용할 경우에는 수유를 피하십시오
- 복용 전후는 음주하지 마십시오
- 장기간 계속해서 사용하지 마십시오

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오
의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.
임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
다음의 증상이 있는 사람.

고열, 배뇨 곤란

다음의 진단을 받은 사람.

심장병, 간장병, 신장병, 위·십이지장 궤양, 녹내장, 호흡기능 장애, 폐색성 수면시 무호흡증후군, 비만증

- 복용 후 다음의 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

피부: 발진·발적, 가려움

소화기: 메스꺼움·구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 위통, 복통, 위·복부팽만감, 속쓰림, 설사

정신신경계: 현기증, 저림

비뇨기: 배뇨 곤란

기타: 과도한 체온 저하, 부종

- 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.

쇼크 (아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉰소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.

피부 점막안 증후군 (스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증, 급성 범발성 발진성 농포증: 고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도돌한 것 (작은 농포) 이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.

약제성 과민증 증후군: 피부가 넓은 범위로 빨개진다, 전신성 발진, 발열, 몸이 나른하다, 림파절 (목, 겨드랑이 밑, 가랑이 등) 의 부음 등이 나타난다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.

신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통 (마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타난다.

간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.

천식: 숨을 쉴 때 색색, 휘휘과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.

재생 불량성 빈혈: 푸른 멍, 콧피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보인다, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타난다.

무과립구증: 갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타난다.

호흡 억제: 숨이 참, 호흡 곤란 등이 나타난다.

- 복용 후 다음의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

변비, 졸음, 입마름

- 5~6 회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 사용기한을 경과한 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 6 개월 이내에 복용하십시오. (품질유지를 위하여)

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.