

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。



発熱・せき・鼻みずに

第2類医薬品

**パブロン<sup>キッズ</sup>かぜシロップ**

販売名:パブロンキッズかぜシロップ〈かぜ薬〉

©Benesse Corporation

- ◆パブロンキッズかぜシロップは、3カ月の乳児から服用いただけるお子さま用のかぜ薬です。
- ◆いちご風味で飲みやすいシロップ剤で、発熱・せき・鼻みず等の症状を改善します。
- ◆お子さまの眠りをさまたげる成分 カフェイン、コデイン類(麻薬成分)、d,l-メチルエフェドリン塩酸塩を配合していません。



## 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 次の人は服用しないでください
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります)
- ④ 服用前後は飲酒しないでください
- ⑤ 長期連用しないでください
- ⑥ 過量服用しないでください\*



## 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (5) 次の診断を受けた人。  
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、眠気
- ④ 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能

かぜの諸症状(発熱、せき、鼻みず、のどの痛み、くしゃみ、たん、鼻づまり、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

発熱・  
のどの痛み等に



せき・たんに



くしゃみ・  
鼻みず・  
鼻づまりに



## 成分

60mL中

アセトアミノフェン 300mg

発熱、頭痛、のどの痛み等、熱と痛みをしずめます。

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 16mg

せきをしずめ、呼吸を楽にします。

グアイフェネシン 83.3mg

のどにからんだたんをやわらかくして、出しやすくします。

クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg

くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。

添加物：白糖、スクラロース、安息香酸、パラベン、クエン酸Na、クエン酸、黄色5号、香料、バニリン

## 用法・用量

添付の目盛付コップで次の量をはかり、1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用してください。

また場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。

年 令	3才以上7才未満	1才以上3才未満	6か月以上1才未満	3か月以上6か月未満	3か月未満
1回量	10mL	7.5mL	6mL	5mL	服用しないこと
服用回数	1日3回				


### [注意]

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- キャップを閉める前にびんの口についた液を清潔なガーゼ等でふいてください。(液が固まってキャップが開けにくくなることがあります)

## お子さまの誤飲を防ぐ安全キャップの使い方

### ●開け方

- ①テーブル等平らな所に置きキャップを下に強く押しながら



- ②矢印の方向に回して開けてください。

### ●閉め方

びんの口の周囲をよくふいてから、キャップをしっかり閉めてください。

※キャップを押さずに回すとカチカチと音がして空回りします。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6か月以内に服用してください。(品質保持のため)



## かぜをひいたお子さまの食事

### ★食欲がないときは…

水分やビタミン・ミネラルをしっかりと補給。



### ★食欲がでてきたら…

栄養価が高く、消化のよいものを。もちろん水分補給も忘れずに。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

●連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

●電話 03-3985-1800

●受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://brand.taisho.co.jp/pabron/>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)