

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	パブロンキッズかぜシロップ
2	成分・分量	60mL 中 アセトアミノフェン 300mg デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 16mg グアイフェネシン 83.3mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg
3	用法・用量	添付の目盛付コップで次の量をはかり、1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用してください。また場合によっては、約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。 3才以上7才未満 1回10mL、1才以上3才未満 1回7.5mL、6ヵ月以上1才未満 1回6mL、3ヵ月以上6ヵ月未満 1回5mL、3ヵ月未満 服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(発熱、せき、鼻みず、のどの痛み、くしゃみ、たん、鼻づまり、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 次の人は服用しないでください <ol style="list-style-type: none"> (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 4. 服用前後は飲酒しないでください 5. 長期連用しないでください 6. 過量服用しないでください 7. 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障 8. 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。