

PABRON KIDS COLD SYRUP

제2류 의약품
감기약

◆파브론 키즈 감기 시럽은 3개월의 유아부터 복용할 수 있는 어린이용 감기약입니다. ■말기향으로 복용하기 쉬운 시럽제로 기침, 콧물, 열 등의 증상을 개선합니다. ■자녀분의 수면을 방해하는 Caffeine, dl-Methylephedrine hydrochloride 등을 배합하지 않았습니다.

효능 또는 효과

감기의 증상(목 통증, 발열, 기침, 가래, 콧물, 코막힘, 재채기, 오한(발열에 따른 오한), 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법 및 용량

눈금 표시가 되어 있는 계량컵으로 다음의 양을 재어, 1일 3회 식후 및 필요할 경우는 취침 전에 복용하십시오. 또한, 경우에 따라서 약 4시간의 간격을 두고 1일 6회까지 복용할 수 있습니다.

3세~6세, 1회 10mL, 1일 3회

1세~2세, 1회 7.5mL, 1일 3회

6개월~1세 미만, 1회 6mL, 1일 3회

3개월~6개월 미만, 1회 5mL, 1일 3회

3개월 미만, 복용하지 말 것

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

소아에게 복용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용하도록 하십시오.

2세 미만의 영유아에게는 의사의 진료를 우선적으로 받게 하고, 부득이한 경우에만 복용하도록 하십시오.

뚜껑을 뚫기 전에 병 입구에 묻은 액을 청결한 거즈 등으로 닦으십시오.(액이 굳어서 뚜껑이 잘 열리지 않을 수 있습니다.)

성분 및 분량

In 60 mL

Dextromethorphan Hydrobromide 16mg

Guaifenesin 83.3mg

Chlorpheniramine Maleate 2.5mg

Acetaminophen 300mg

첨가물

Sugar,Sucralose ,Benzoic acid,Butyl parahydroxybenzoate,Sodium citrate,citric acid,Sunset Yellow FCF ,flavor,Vanillin

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

본제는 소아용이지만, 기약약으로서 정해진 일반적인 주의사항을 기재하고 있습니다.

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어나기 쉽다)

다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.

본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

본제 또는 다른 감기약, 해열 진통제를 복용해 천식을 일으킨 적이 있는 사람.

●이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것

다른 감기약, 해열 진통제, 진정제, 진해 거담제, 항히스타민제를 함유하는 내복약 등(비염용 내복약, 멀미약, 알레르기용 약 등)

●복용 후 차량 또는 기계류의 운전 조작을 하지 않을 것(졸음 등이 나타날 수 있다.)

복용 전후는 음주하지 마십시오.

●장기간 연용하지 않을 것

상담할 내용

●다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

다음의 증상이 있는 사람.

고열

배뇨 곤란

다음의 진단을 받은 사람.

심장병

간장병

신장병

위·십이지장 궤양

녹내장

●복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

피부:

발진·발적

가려움

소화기:

메스꺼움
구토
식욕 부진
정신신경계:
현기증
호흡기:
숨이 참
호흡 곤란
비뇨기:
배뇨 곤란
기타:

과도한 체온 저하

드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉼소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.

피부 점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증, 급성 범발성 발진성 농포증: 고열, 눈 충혈, 눈곱, 입술 진무름, 인후 통증, 피부의 광범위한 발진·발적, 빨개진 피부에 작고 도돌한 것(작은 농포)이 생김, 전신의 나른함, 식욕이 없는 증상 등이 지속되거나 급격히 악화된다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타납니다.

신장 장애: 발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신의 나른함, 관절통(마디마디가 아픈 증상), 설사 등이 나타납니다.

간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.

천식: 숨을 쉴 때 색색, 휘휘과 같은 소리가 나며, 답답함 등의 증상을 보인다.

재생 불량성 빈혈: 푸른 명, 코피, 잇몸 출혈, 발열, 피부와 점막이 창백해 보임, 피로감, 두근거림, 숨이 참, 속이 안 좋아지며 어질해짐, 혈뇨 등이 나타납니다.

무과립구증: 갑작스런 고열, 오한, 인후통 등이 나타납니다.

●복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

입마름

졸음

●5~6회 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 뚜껑을 닫은 채 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 6개월 이내에 사용하십시오.(품질유지를 위하여)

21

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

·본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.

·다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.

·다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.

·다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..