

## パブロン鼻炎速溶錠EX

◆パブロン鼻炎速溶錠EXは、お口の中ですばやく溶けて、急な鼻炎症状にすぐれた効果を発揮する鼻炎内服薬です。●水なしでも服用でき、場所を選ばずどこでも簡単に服用できます。●清涼感が広がるミルク&メントール風味です。

## 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

## 用法・用量

次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

- 15才以上、1回2錠、1日3回
- 7才～14才、1回1錠、1日3回
- 7才未満、服用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

錠剤の取り出し方

- 図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
- （誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

## 成分及び分量

2錠中

- 塩酸ブソイドエフェドリン 40mg
- dl-メチルエフェドリン塩酸塩 10mg
- クロルフェニラミンマレイン酸塩 2mg
- グリチルリチン酸二カリウム 15mg
- ペラドンナ総アルカロイド 0.2mg
- 無水カフェイン 25mg

## 添加物

D-マンニトール、粉糖、トウモロコシデンプン、セルロース、無水ケイ酸、クロスボビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、スクラロース、ステアリン酸カルシウム、l-メントール、香料

## 使用上の注意

## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

前立腺肥大による排尿困難

次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

心臓病

高血圧

糖尿病

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

●服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）

●長期連用しないこと

## 相談すること

●次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

授乳中の人。

高齢者。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。

次の症状のある人。

高熱

排尿困難

次の診断を受けた人。

緑内障

腎臓病

モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。

(セレギリン塩酸塩は、パーキンソン病の治療に用いられます)

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 皮膚：  
発疹・発赤  
かゆみ  
消化器：  
吐き気  
嘔吐  
食欲不振  
精神神経系：  
めまい  
不眠  
神経過敏  
頭痛  
けいれん  
泌尿器：  
排尿困難  
その他：  
顔のほてり  
異常なまぶしさ

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

再生不良性貧血：青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

無顆粒球症：突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

●5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6か月以内に服用してください。（品質保持のため）

11

### 【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。