

服用に際しては、下記説明をよく読んでください。

5種の配合生薬の力

パブロン 滋養内服液

販売名：大正滋養液Ⅱ
指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】

☆発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・栄養障害・肉体疲労・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成分】 1本（50mL）中

ショウキョウ（生姜）エキス……………44.5mg （生姜 400mg に相当）	カンゾウ（甘草）エキス……………25mg （甘草 100mg に相当）
ケイヒ（桂皮）流エキス……………0.15mL （桂皮 150mg に相当）	タウリン……………500mg
シャクヤク（芍薬）エキス……………30mg （芍薬 120mg に相当）	リボフラビンリン酸エステルナトリウム （ビタミン B ₂ ）……………5mg
タイソウ（大棗）エキス……………80mg （大棗 200mg に相当）	ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）……………5mg
	ニコチン酸アミド……………20mg

添加物：白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、安息香酸 Na、パラベン、pH調整剤、カラメル、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

お客様 119 番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社²¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>