

パブロン滋養内服液

効能・効果

- ☆発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・栄養障害・肉体疲労・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- ☆滋養強壮
- ☆虚弱体質

用法・用量

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。
※15才未満は服用しないでください

注意

定められた用法・用量を厳守してください。
（他のビタミン等を含む製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

成分及び分量

1本（50mL）中
ショウキョウエキス 44.5mg
ケイヒ流エキス 0.15mL
シャクヤクエキス 30mg
タイソウエキス 80mg
カンゾウエキス 25mg
タウリン 500mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2） 5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6） 5mg
ニコチン酸アミド 20mg

添加物

白糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、安息香酸Na、パラベン、pH調節剤、カラメル、香料

注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません

使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹
消化器：胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に保管してください
小児の手の届かない所に保管してください。
使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

21

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。