

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	パブロン[®]のど錠
2	成分・分量	6錠中 トラネキサム酸 750mg グリチルリチン酸二カリウム 63mg ニコチン酸アミド 60mg ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B ₆) 50mg リボフラビン(ビタミン B ₂) 12mg
3	用法・用量	次の量を1日3回、朝昼晩にかむか、口中で溶かして服用してください。 成人(15才以上) 1回2錠 7才～14才 1回1錠 7才未満 服用しないこと
4	効能・効果	扁桃炎・咽頭炎(のどの痛み、のどのはれ)、口内炎
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください <ol style="list-style-type: none"> 甘草(カンゾウ)又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬 (むくみ、血圧上昇及び筋疾患(ミオパチー)等が起こることがあります) トラネキサム酸を含有する内服薬 (鼻炎用内服薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等) 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 高齢者。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 次の症状のある人。 むくみ 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等)、血栓症を起こすおそれのある人 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。