

# PABRON THROAT TABLETS

- ◆PABRON THROAT TABLETS 在口腔中快速溶解，对喉咙疼痛和肿胀能发挥良好的效果。
- ◆在没有水及任何地方的条件下都可以服用。

## 效能

扁桃腺炎，咽炎（咽喉肿胀、喉咙疼痛），口腔溃疡

## 用法及用量

请按以下用量在口中咬碎或溶解后服用：

成人（15岁以上），1次2片，1天3次，早中晚服用

7岁~14岁，1次1片，1天3次，早中晚服用

未满7岁，不宜服用

### 注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 本药物可以选择在饭前或者是饭后服用。
- 给7岁以上的小儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

### 药片的取用方法

指尖用力按下装有药片的 PTP 板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。

（以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

## 成分

6片中

传明酸 750mg

甘草酸二钾 63mg

烟酰胺 60mg

吡哆醇盐酸盐（维生素 B<sub>6</sub>） 50mg

核黄素（维生素 B<sub>2</sub>） 12mg

### 添加剂

纤维素，二氧化硅，玉米淀粉，D-甘露醇，交联聚维酮，阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物），乙酰磺胺酸钾，三氯蔗糖，柠檬酸，硬脂酸镁，香料，辛烯基琥珀酸淀粉钠

### 注意

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素 B<sub>2</sub>引起的现象，因此不用担心

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品  
含甘草或其主要成分甘草甜素物的内服药等  
（可能会发生肿胀、血压升高及肌肉疾病（肌病）等情况）  
含传明酸物的内服药等  
（鼻炎用内服药、感冒药、解热镇痛药、镇咳祛痰药等）
- 不要长期连续服用

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师或牙科医师治疗的人群。  
孕妇或有其可能性的人群。  
老年人。  
因药物等出现过过敏症状的人群。  
拥有以下症状的人群。  
浮肿  
接受以下诊断的人群。  
高血压，心脏病，肾脏病，有血栓的人群（脑血栓、心肌梗塞、血栓性静脉炎等），可能出现血栓症的人群
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：起疹、发红，发痒

消化系统：恶心、呕吐、烧心、食欲不振或增进食欲、胃部不适

精神神经系统：头晕

泌尿系统：尿频

- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

假性醛固酮增多症、肌病：除了四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症状之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。

- 服用后，可能会出现下述症状，如果此类症状出现持续或加重时，请停止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

腹泻

- 如果服用了 5~6 天后症状仍无改善时，请停止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)
- 本药剂为了防止光线引起药变质,内袋(铝袋)一旦开封后,保管时请放回盒子中等,置于光线照射不到的场所保管。
- 请勿服用超过使用期限的产品。另外,即使在使用期限内,内袋(铝袋)开封后,请在 6 个月内服用。(为了保证质量)

11

### 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的,基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译,仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商(或本公司)的暂时翻译,今后有可能会被修改或变更,恕不另行通知。
- 供应商(或本公司)对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。