

# PABRON THROAT TABLETS

- ◆PABRON THROAT TABLETS 는 입안에서 빠르게 녹아, 목구멍의 통증이나 부기에 뛰어난 효과를 발휘합니다.
- ◆물 없이 장소를 가리지 않고 어디서나 복용할 수 있습니다.

## 효능

편도선염 · 인두염 (인후통·목 부음), 구내염

## 용법 및 용량

다음의 양을 씹거나 입 안에서 녹여서 복용하십시오.  
성인 (15 세 이상), 1 회 2 정, 1 일 3 회 아침, 낮, 밤에 복용하십시오.  
7 살 ~ 14 살, 1 회 1 정, 1 일 3 회 아침, 낮, 밤에 복용하십시오.  
7 세 미만, 복용하지 말 것

### 주의

- 정해진 용법 · 용량을 엄수해 주십시오.
- 식전, 식후, 언제 복용해도 관계없습니다.
- 7 살 이상의 소아에게 복용하게 하는 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용하게 하십시오.

### 정제 꺼내는 법

정제가 들어 있는 PTP 시트의 철부를 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오.

(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 꽂히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)

## 성분

In 6 tablets

트라 넥 삼산 750mg

글리시리진산디칼륨 63mg

니코틴산 아미드 60mg

피리독신 염산염(비타민 B<sub>6</sub>) 50mg

리보플라빈(비타민 B<sub>2</sub>) 12mg

### 첨가물

셀룰로오스, 무수 규산, 옥수수 전분, D-만니톨, 크로스포비돈, 아스파탐(L-페닐알라닌 화합물), 아세살팜 칼륨, 수크랄로오스, 구연산, 마그네슘스테아레이트, 향료, 옥테닐석신산나트륨전분

### 주의

본제의 복용으로 인해 소변 색깔이 노래지는 경우가 있으나, 이는 약에 포함되어 있는 Vitamin B<sub>2</sub>가 흡수됨에 따른 것으로 걱정하실 필요 없습니다.

## 사용상의 주의

### 해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

- 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어떤 의약품도 복용하지 않을 것  
감초 이거나또는 그 주성분 루리 을 함유하는 내복약 등  
(부종, 혈압상승 및 근질환(근육병)등이 일어날 수 있습니다)  
트라 넥 삼산 을 함유하는 내복약 등  
(비염용 내복약,감기약, 해열 진통제, 진해 거담제, 등)

- 장기간 연용하지 않을 것

### 상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것  
의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.  
임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.  
고령자.  
약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.  
다음의 증상이 있는 사람.  
부종  
다음의 진단을 받은 사람.

고혈압, 심장병, 신장병, 혈전이 있는 사람(뇌혈전, 심근경색, 혈전성 정맥염, 등), 혈전증을 일으킬 우려가 있는 사람

- 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.  
피부: 발진·발적, 가려움  
소화기: 메스꺼움·구토, 가슴 쓰림, 식욕 부진 또는 식욕 증진, 위 불쾌감  
정신신경계: 현기증  
비뇨기: 빈뇨
- 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.  
가성 부신 질환, 근육병: 손발의 나른함, 저림, 당김과 경직에 더해 탈력감, 근육통이 나타나며 점차 심해진다.
- 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속되거나 증강된 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.  
설사
- 5~6 일간 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 치과의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

### 보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 빛에 의한 약액의 변질을 막기 위하여, 일단 속봉투(알루미늄 봉투)를 상자에 다시 넣는 등 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용기한을 경과한 제품은 복용하지 마십시오. 또한, 사용 기한 내라 해도 안쪽 봉투 (알루미늄 봉투)를 개봉한 후에는 6개월 이내에 복용하십시오.(품질 유지를 위해)

11

### 【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.