

PABRON THROAT TABLETS

- ◆PABRON THROAT TABLETS 於口中快速溶解，對喉嚨疼痛和腫脹發揮作用。
- ◆無須配服開水，無論何時何地皆可服用。

療效

扁桃腺炎，咽喉炎（喉嚨疼痛、腫脹），口內炎

用法及用量

請將以下用量於口中咬碎或溶解後服用：

成人（15 歲以上），1 次 2 片，1 天 3 次，早午晚服用

7 歲~14 歲，1 次 1 片，1 天 3 次，早午晚服用

未滿 7 歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 飯前飯後，任一時段服用皆可。
- 給 7 歲以上的兒童服用時，請在監護人的指導監督下服用。

錠劑取出方法

如圖所示，以指尖用力按壓藥錠 PTP 包裝凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出藥錠服用。

（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

成分

6 片中

傳明酸 750mg

甘草酸鉀 63mg

菸鹼醯胺 60mg

鹽酸吡哆辛(維生素 B₆) 50mg

核黃素(維生素 B₂) 12mg

添加劑

纖維素，二氧化矽，玉米澱粉，D-甘露醇，交聯聚維酮，阿斯巴甜(L-苯丙氨酸化合物)，醋磺內酯鉀，三氯蔗糖，檸檬酸，硬脂酸鎂，香料，辛烯基丁二酸鈉澱粉

注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響，無須擔憂

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。
 - 含甘草或其主要成分甘草甜素口服藥物等
（有可能引起浮腫、血壓上升及肌肉疾患（肌病）等）
 - 含傳明酸口服藥物等
（鼻炎用內服藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮咳祛痰藥等）
- 請勿長期連續服用

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
年長者。
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
有下列症狀的人。
 - 浮腫
 - 接受過下列診斷的人。
 - 高血壓，心臟病，腎臟病，有血栓的人（腦血栓、心肌梗塞、栓塞性靜脈炎等），可能引發血栓症的人
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：發疹、發紅，發癢

消化器官：噁心、嘔吐、燒心、食欲不振或食欲增加、胃部不適

精神神經系統：頭暈

泌尿器官：頻尿

●極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

假性醛固酮增多症、肌肉病變：除了手腳乏力、痠麻、抽筋感和僵硬之外，出現無力感、肌肉疼痛，且症狀漸漸變嚴重。

●服用後，可能出現下列症狀，若這類症狀持續或加劇，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉

●若服用 5~6 天後症狀仍未改善，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 本藥劑為避免光線造成變質，內袋(鋁箔袋)一經開封後，保存時請收入外盒並置於避免受光線照射之處保管。
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限之內，內袋(鋁袋)一經開封，請於 6 個月內服用完畢。(為確保品質)

11

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。