

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 名 称 | パブロンSせき止め |
| 2 | 成分・分量 | 2 カプセル中 ブロムヘキシン塩酸塩 4mg ジヒドロコデインリン酸塩 10mg ノスカピン 20mg <i>d</i> -メチルエフェドリン塩酸塩 25mg マレイン酸カルビノキサミン 4mg 無水カフェイン 50mg |
| 3 | 用法・用量 | 次の量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。 15才以上 1回2カプセル、12才～14才 1回1カプセル、 12才未満 服用しないこと |
| 4 | 効能・効果 | せき・たん |
| 5 | 保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項 | <ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)12才未満の小児。 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静剤、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 過量服用・長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p> |
| 6 | 薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項 | |

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。