

◆百保能S止咳膠囊為有效舒緩惱人咳嗽、痰涎症狀的軟膠囊止咳藥。

療效或效果

咳嗽、痰涎

用法及用量

請盡量於餐後30分鐘內用冷水或微溫水服用以下用量：

1 5歲以上，1天3次，1次2粒膠囊

12~14歲，每天3次，每次1膠囊

未滿12歲：請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

●膠囊取出方法

●以指尖用力按壓膠囊PTP包裝的凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出膠囊服用。（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

成分及分量

2粒膠囊中

Bromhexine hydrochloride 4mg

Dihydrocodeine Phosphate 10mg

Noscapine 20mg

dl-Methylephedrine Hydrochloride 25mg

Carbinoxamine maleate 4mg

Anhydrous caffeine 50mg

添加劑

Potato starch,Medium-chain fatty acid triglyceride,Propylene glycol fatty acid ester,Gelatin,Glycerin,Polysorbate 80,Butyl parahydroxybenzoate,Titanium oxide,Sunset Yellow FCF

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

符合下列情形者請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑成分引發過敏症狀者。

未滿12歲的兒童。

服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

其他鎮咳祛痰藥、感冒藥、鎮靜藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）

●服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等。）

哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

●請勿過量服用、長期連續服用

諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

老年人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

發高燒

排尿困難

接受過下列診斷的人。

心臟病

高血壓

糖尿病

青光眼

甲狀腺功能障礙

呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸中止症、肥胖症

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

消化器官：

噁心

嘔吐

食欲不振

精神神經系統：

頭暈

泌尿器官：

排尿困難

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

呼吸障礙：出現氣短、呼吸困難等

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
便秘、嗜睡

口乾

●即使用5~6次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。（為確保品質）

81

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。