

◆儿童的疾病都是从发烧开始的，所以发烧是最常见的症状。但是，发烧有可能会导导致体力的消耗等，因此退烧很重要。●儿童用Pabron栓剂是有效地缓解儿童急性发烧症状的药剂。

效能或效果

儿童发烧时的暂时性退烧

用法及用量

请按以下用量插入肛门内：

6岁~12岁， 1天1次， 1次1~2粒

3岁~5岁， 1天1次， 1次1粒

1岁~2岁， 1天1次， 1次1/2~1粒

未满1岁， 不宜使用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。

本药剂请勿连续使用2天。

本药剂仅限用于肛门，请勿内服。

成分及分量

1粒 (1 g 中)

Acetaminophen 100mg

添加剂

Hard fat

使用注意事项

禁止事项

本药剂为儿童用药，记载着解热药中所规定的一般性注意事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)

下述人群请不要使用。

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群

●在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药

●使用前不要饮酒

●不要长期连续服用

咨询事项

●以下人群在使用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师或牙科医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

老年人

虚弱者

因药物等出现过过敏症状的人群

接受以下诊断的人群

心脏病

肝脏病

肾脏病

胃及十二指肠溃疡

使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：

恶心

呕吐

食欲不振

腹泻

软便

便意

精神神经系统：

头晕

其他：

体温过低
偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
休克（过敏性）：使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。
肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。
哮喘：呼吸时出现哮喘音、气闷等情况。
如果使用一次后再次发烧，请停止使用，
并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的30℃以下的阴凉场所
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
保管时，请将栓剂的前端向下放进外箱中，并沿着外箱的标记立着保管
请勿服用超过使用期限的产品。
且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

91

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任