

服用前請務必閱讀本說明書。
此外，請妥善保管以備不時之需。

用於難受的喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、發燒時

PABRON ACE PRO-X

TABLETS

銷售名稱：PABRON ACE PRO-X TABLETS

第2類醫藥品 (感冒藥)

◆ PABRON ACE PRO-X TABLETS 為含布洛芬、羧甲基半胱氨酸、鹽酸氨溴索、鹽酸偽麻黃鹼等 7 種有效成分配方，有效緩解喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、發燒等 11 種惱人感冒症狀的感冒藥。



使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，可能導致目前的症狀惡化，或者容易引發副作用、意外)

1 符合下列情形者請勿服用

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
- (2) 曾因服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥而引起氣喘者。
- (3) 未滿 15 歲的兒童。
- (4) 預產期 12 週內的孕婦。
- (5) 正在醫療機構接受下列疾病的治療或服用下列醫藥品者。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、血液疾病、肝臟病、腎臟病、心臟病、高血壓、正在服用齊多夫定 (RETROVIR 等) 者
- (6) 有下列症狀的人。
因前列腺肥大而排尿困難

(7) 受診斷為患有下列疾病者。

高血壓、心臟病、甲狀腺功能障礙、糖尿病

2 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品
其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺的內服藥等 (鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等)

3 服用後請勿駕駛交通工具或操作機械

(可能出現嗜睡等)

4 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

(動物試驗證明藥物成分會轉移到乳汁內)

5 服用前後請勿飲酒

6 請勿服用超過 5 天



諮詢事項



1 下列人士服用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師或牙科醫師治療者。
- (2) 孕婦或可能懷孕者。
- (3) 老年人。
- (4) 曾因藥物等引發過敏症狀者。
- (5) 曾因服用感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎用內服藥等而出現失眠、暈眩、無力感、發抖、心悸等症狀者。
- (6) 有下列症狀的人。
發高燒、排尿困難
- (7) 受診斷為患有下列疾病者或曾罹患該疾病者。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍、血液疾病、肝臟病、腎臟病、支氣管哮喘、全身性紅斑性狼瘡、混合性結締組織病、潰瘍性大腸炎、克隆氏症、青光眼、呼吸功能障礙、阻塞性睡眠呼吸中止症、肥胖症
- (8) 正在接受單胺氧化酶抑制劑 (鹽酸希利治林等) 治療者。(鹽酸希利治林用於治療帕金森氏症)

2 服用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

曾發生下列罕見嚴重症狀。

如遇到此類情況，請立刻接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。
血液功能障礙	容易出現瘀青、突然高燒、發冷、喉嚨疼痛、容易出血 (牙齦出血、流鼻血等)、不易止血等。
消化器官障礙	出現黑色糞便、吐血、血便、黏血便 (夾雜血液、黏液、膿的軟便) 等。
史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死脫層症、急性廣泛性發疹性膿疱症	發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍出疹、發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒 (小膿疱)、全身倦怠、沒食欲等症狀持續，或者突然惡化。
肝功能障礙	出現發燒、發癢、出疹、黃疸 (皮膚和眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等情況者。
腎功能障礙	出現發燒、出疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛 (各關節疼痛)、腹瀉等。
無菌性腦膜炎	出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心、嘔吐等。(尤其是接受全身性紅斑性狼瘡或混合性結締組織病治療的人，很多通報這種症狀。)
心肌梗塞*	壓迫般的胸痛、呼吸困難、冒冷汗。
腦血管疾病*	出現意識模糊、失去意識、單側手腳活動困難、頭痛、嘔吐、暈眩、說話吃力、說不出話等症狀。
間質性肺炎	爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短、呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。
氣喘	呼吸時發出呼呼吸聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。
再生不良性貧血	出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適與暈眩、血尿等。

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、搔癢、浮腫、出現瘀青
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃部不適、胃痛、口腔潰瘍、胸口灼熱、胃脹、胃腸出血、腹痛、腹瀉、血便、胃部腹部膨脹感
精神神經系統	暈眩、痠麻感、失眠、情緒鬱悶、神經過敏、痙攣
循環器官	心悸
呼吸器官	呼吸短促
泌尿器官	排尿困難
其他	視力模糊、耳鳴、浮腫、流鼻血、牙齦出血、不易止血、出血、背痛、體溫過低、身體倦怠

無顆粒性白血球症	出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。
呼吸障礙	出現呼吸短促、呼吸困難等。

- 服用後可能出現下列症狀，如該症狀持續或加劇，請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
便秘、口乾、嗜睡
- 若服用 5~6 次症狀卻未見改善，請停止服用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
(特別是連續發燒超過 3 天或反覆發燒時)

用法及用量

請盡可能在用餐後 30 分鐘以內，以冷開水或溫水服用以下的量。

年齡	1 次量	服用次數
成人 (15 歲以上)	3 錠 	1 天 3 次
未滿 15 歲	不可服用	

[注意]

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 錠劑取出方法

如圖所示，以指尖用力按壓裝有錠劑之 PTP 泡殼的凸出部位，使鋁箔背膜破裂後取出服用。
(不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生)



療效

舒緩感冒的各種症狀 (喉嚨痛、咳嗽、生痰、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、發燒、畏寒 (發燒引起的身體寒冷)、頭痛、關節痛、肌肉痠痛)

喉嚨痛、發燒等時



咳嗽、有痰時



打噴嚏、流鼻水、鼻塞時



成分

3 錠中

布洛芬	200mg	對發炎、疼痛的根源發揮作用，緩解喉嚨痛與發燒。
羧甲基半胱氨酸	250mg	讓呼吸道黏液、黏膜接近正常狀態，痰能更容易排出。
鹽酸氨溴索	15mg	透過活化呼吸道黏膜的纖毛運動，讓黏膜表面變得更光滑，藉此讓喉嚨症狀原因之一的痰能更容易排出。
磷酸二氫可待因	8mg	對咳嗽中樞發揮作用，緩解咳嗽。
鹽酸偽麻黃鹼	45mg	透過血管收縮作用抑制鼻腔黏膜的充血、腫脹，改善鼻塞。
縮水蘋果酸氯芬尼拉明	2.5mg	抑制打噴嚏、流鼻水、鼻塞的症狀。
核黃素 (維生素 B ₂)	4mg	補充感冒時容易消耗的維生素。

添加物：纖維素、二氧化矽、矽酸鋁鎂、羧甲基澱粉鈉、羥丙甲纖維素、磷酸氫鈣、羥丙基纖維素、硬脂酸鎂、滑石

[注意] 因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響，無須擔憂。

保管及使用上的注意事項

- 請保管於濕度較低的陰涼處，避免日光直射。
- 請保管於兒童無法觸及之處。
- 請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- 請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。(為確保品質)



【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商 (或我們) 的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商 (或我們) 對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。