

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	パブロンセレクトT
2	成分・分量	2錠中 アムプロキシソール塩酸塩 15mg L-カルボシステイン 250mg グリチルリチン酸二カリウム 13.3mg(6錠中 40mg) イブプロフェン 150mg ジヒドロコデインリン酸塩 8mg dI-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg リボフラビン(ビタミンB₂) 4mg
3	用法・用量	次の量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。 成人(15才以上) 1回2錠 15才未満 服用しないこと
4	効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、悪寒(発熱によるさむけ)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	- 次の人は服用しないでください - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 15才未満の小児。 - 出産予定日12週以内の妊婦。 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) - 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (動物試験で乳汁中への移行が認められています) - 服用前後は飲酒しないでください 5日間を超えて服用しないでください - 次に該当する人はお申し出ください - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。 - 高齢者。 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 - 次の症状のある人。 高熱、排尿困難 - 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 - 次の病気にかかったことのある人。 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病

6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	
---	-----------------------	--

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。