

パブロン滋養内服液プレミアム

指定医薬部外品
ドリンク剤

効能・効果

- ☆ 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ☆ 疲労の回復・予防
- ☆ 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：
疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい
- ☆ 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法・用量

- 成人（15才以上） 1日1回1本（50mL）を服用してください。
15才未満、服用しないこと
定められた用法・用量を厳守してください。
（他のビタミン等を含む製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）

成分及び分量

- 50mL中
ショウキョウエキス 77.8mg
ショウキョウ流エキス 0.3mL
ケヒ流エキス 0.15mL
シャクヤクエキス 30mg
タイソウエキス 300mg
カンゾウエキス 30mg
トウキ流エキス 0.3mL
チンピエキス 20mg
ニンジンエキス-P 85.8mg
シゴカ流エキス 0.2mL
サンヤク流エキス-A 0.2mL
アミノエチルスルホン酸(タウリン) 500mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム 12mg
ピリドキシン塩酸塩 10mg
ニコチン酸アミド 20mg

添加物

白糖、クエン酸、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、安息香酸ナトリウム、パラベン、カラメル、香料、アルコール（アルコール0.39mL以下）

成分及び分量に関連する注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません

使用上の注意

相談すること

服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚：

発疹

消化器：

胃部不快感

服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に保管してください

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

直射日光の当たらない涼しい所に保管してください

小児の手のとどかない所に保管してください。

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。