

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	プリザクールジェル
2	成分・分量	100g 中 クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g / -メントール 0.1g 塩酸リドカイン 3g 塩酸テトラヒドロゾリン 0.05g ベンザルコニウム塩化物 0.05g
3	用法・用量	適量をとり、1日1~3回、肛門部に塗布してください。
4	効能・効果	いぼ痔・きれ痔(さけ痔)のかゆみ・はれ・痛み・出血の緩和及び消毒
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。