

◆PRESER COOL GEL是对痔疮的发痒、肿胀有效的涂抹药剂。■此药剂为不粘稠的水性凝胶类型，涂抹后马上会感觉到凉爽的使用效果。

效能或效果

缓解痔疮、肛裂的发痒、肿胀、疼痛、出血以及消毒

用法及用量

1天1~3次，请取适量涂抹于肛门处。

请严格遵守规定的用法用量。

在使用之前洗澡或用温水清洗患处，早上在排便后、晚上在入睡前使用的话，效果会更好。

儿童使用时应在监护人指导监督下使用。

仅限用于肛门处。

使用效果会因人而异。皮肤、粘膜等敏感的人群，可能会感觉到很强的清凉效果，请从少量开始试用

成分及分量

100 g 中

Chlorpheniramine Maleate 0.2g

l-Menthol 0.1g

Lidocaine hydrochloride 3g

Tetrahydrozoline hydrochloride 0.05g

Benzalkonium chloride 0.05g

添加剂

Carboxyvinyl polymer, Polyoxyethylene hydrogenated castor oil, pH adjusting agent, Anhydrous ethanol

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

红肿

其他：

刺激感

即使使用10日左右仍不见症状好转时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

52

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任