

プリザクールジェル

◆プリザクールジェルは、痔のかゆみ・はれに効果的な塗り薬です。■べたつかない水性のジェルタイプで、塗ってすぐクールな使用感が実感できます。

効能・効果

いぼ痔・きれ痔（さけ痔）のかゆみ・はれ・痛み・出血の緩和及び消毒

用法・用量

適量を取り、1日1～3回、肛門部に塗布してください。

定められた用法・用量を厳守してください。

ご使用前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、朝の場合は排便後に、夜の場合は寝る前に使用すると一層効果的です

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

肛門部にのみ使用すること。

使用感には個人差があります。皮ふ、粘膜などが敏感な人は、清涼感を強く感じる場合がありますので、少量からお試ください

成分及び分量

100g中

クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.2g

l-メントール 0.1g

塩酸リドカイン 3g

塩酸テトラヒドロゾリン 0.05g

ベンザルコニウム塩化物 0.05g

添加物

カルボキシビニルポリマー、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤、エタノール

使用上の注意

相談すること

●次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

はれ

その他：

刺激感

10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

52

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。