

◆PRESER COOL GEL為有效緩解痔瘡搔癢、腫脹的外用藥劑。■清爽水凝膠劑型，塗抹後立即帶來清涼感受。

療效或效果

疣痔、肛裂的搔癢、腫脹、疼痛、出血的舒緩及消毒

用法及用量

請取適量，1天1~3次，塗抹於肛門位置。

請務必遵守規定用法、用量。

請於入浴後或以溫水清潔患部後再行使用。早晨排便後或夜間入睡前使用將使效果更佳

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

請只使用於肛門部位。

使用感因人而異。皮膚、黏膜等較為敏感者可能感到過於清涼，請先以少量試用後再行使用

成分及分量

100g中

Chlorpheniramine Maleate 0.2g

l-Menthol 0.1g

Lidocaine hydrochloride 3g

Tetrahydrozoline hydrochloride 0.05g

Benzalkonium chloride 0.05g

添加劑

Carboxyvinyl polymer, Polyoxyethylene hydrogenated castor oil, pH adjusting agent, Anhydrous ethanol

使用上的注意事項

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

腫脹

其他：

刺激感

使用10天左右症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

52

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。

・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。

・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。

・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。