

◆治疗痔疮，首先从管理通便开始吧。便秘会引发排便时的痛感，是恶化痔疮症状的原因之一。●PRESER汉方内服药通过温和的排便作用使大便通畅，同时促进患处的血液循环，改善痔疮的症状。■此药剂为易服用的颗粒型汉方处方药“乙字汤”。

效能或效果

体力中等以上，大便发硬、有便秘倾向的人的下述各种症状：痔核、肛裂、便秘、轻度脱肛

用法及用量

1天3次，在饭前或饭间，请按以下用量并配合水或温开水服用：

成年人（15岁以上），1天3次，1次1包

7岁~14岁，1次2/3片

4~6岁，1次1/2包

2~3岁，1次1/3包

未满2岁，1次1/4包

饭间服用，要以饭后2~3小时为基准。

请严格遵守规定的用法用量。

儿童使用时应在监护人指导监督下使用。

未满1岁的婴儿应优先就医，只有在不得已时才能服用

成分及分量

1天量（2.0 g × 3包）中

Otsujito Extract 3.4g (Extracted from 3.0 g of Japanese Angelica Root, 2.5 g of Bupleurum Root, 1.5 g of Scutellaria Root, 1.0 g of Glycyrrhiza, 0.75 g of Cimicifuga Rhizome, and 0.5 g of Rhubarb)

添加剂

Magnesium aluminometasilicate ,Hypromellose,Lactose ,Corn starch ,flavor

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

●下述人群不要服用

产后未满3个月的婴儿。

在服用本药剂期间，不要服用下述任何药物。

其他泻下药（泻药）

处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

身体虚弱人群（体力不足、身体虚弱的人群）。

肠胃虚弱，容易腹泻的人群。

老年人

此前因药物等出现过发疹、发红、发痒等症状的人群。

拥有以下症状的人群

浮肿

接受以下诊断的人群

高血压

心脏病

肾脏病

服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：

恶心

呕吐

食欲不振

伴随剧烈腹痛的腹泻

腹痛

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。

假性醛固酮增多症、肌病：除了四肢无力、发麻、抽筋、僵硬等症状之外，还出现乏力感、肌肉疼等症状，并且逐渐加重。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

腹泻

服用了1个月左右（因肛裂、便秘服用时为5~6天）仍不见症状好转时，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

●若长期连续服用时，应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

本药剂含天然成分，不同产品的颜色会有所不同，但效果不变。

将1包分开服用时，折叠袋口进行保管，并在2天之内服用。

请勿使用超过使用期限的产品。

81

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任