

◆치질 치료는 먼저 변통 관리부터 시작합니다. 변비는 배변 시에 통증을 유발하여 치질의 증상을 악화시키는 원인 중 하나입니다. ◀Preser 한방 내복 약은 원활한 배변 작용으로 인해 변통을 좋게 하면서 환부의 혈액 순환을 촉진하여 치질의 증상을 개선합니다. ▶복용하기 쉬운 세립의 한방처방 'Otsujito'입니다.

효능 또는 효과

체력 중등도 이상으로 대변이 딱딱하고 변비경향이 있는 자의 다음의 증상: 수치질, 열항, 변비, 경도의 탈항

용법 및 용량

다음의 양을 1일 3회, 식전 또는 식간에 찬물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

성인(15세 이상), 1회 1포, 1일 3회

7~14세, 1회 2/3포

4~6세, 1회 1/2포

2~3세, 1회 1/3포

2세 미만, 1회 1/4포

식간 복용은 식사 후 2~3시간을 기준으로 합니다.

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하게 할 것.

1세 미만인 유아에게는 의사의 진료를 우선적으로 받게 하고, 부득이한 경우에만 복용하도록 하십시오.

성분 및 분량

In daily dose (2.0 g × 3 packets)

Otsujito Extract 3.4g (Extracted from 3.0 g of Japanese Angelica Root, 2.5 g of Bupleurum Root, 1.5 g of Scutellaria Root, 1.0 g of Glycyrrhiza, 0.75 g of Cimicifuga Rhizome, and 0.5 g of Rhubarb)

첨가물

Magnesium aluminometasilicate ,Hypromellose,Lactose ,Corn starch ,flavor

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

● 다음에 해당하는 사람은 복용하지 말 것

생후 3개월 미만의 유아.

본제를 복용하는 동안은 다음의 어떤 의약품도 사용하지 마십시오.

다른 완하제(설사약)

수유 중인 사람은 본제를 복용하지 않거나 본제를 복용할 경우에는 수유를 피하십시오.

상담할 내용

● 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

신체가 허약한 사람(체력이 떨어진 사람, 몸이 약한 사람)

위장이 약하고 설사하기 쉬운 사람.

고령자.

지금까지 약 등으로 인해 발진·발적, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람.

다음의 증상이 있는 사람.

부종

다음의 진단을 받은 사람.

고혈압

심장병

신장병

복용 후, 다음의 증상이 나타날 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단하고 이 문서를 지참한 후 의사 또는 약사와 상담하십시오.

피부:

발진·발적

가려움

소화기:

메스꺼움

구토

식욕 부진

심한 복통을 수반하는 설사

복통

드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

간질성 폐렴: 계단을 오르거나, 조금 무리하면 호흡 곤란·숨이 참, 마른 기침, 발열 등을 보이며, 이들 증상이 갑자기 나타나거나 지속된다.

가성 부신 질환, 근육병: 손발의 나른함, 저림, 당김과 경직에 더해 탈력감, 근육통이 나타나며 점차 심해진다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.

●복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

설사

1개월 정도(열항, 변비에 복용하는 경우에는 5~6일간) 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우는 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

●장기 연용하는 경우에는 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

본제는 천연물을 성분으로 하고 있으므로 제품에 따라 약간 색깔이 다를 수 있지만, 효과는 변함 없습니다.

한 포를 나눈 나머지를 복용할 경우는 봉투 입구부분을 접어서 보관하고 2일 이내에 복용하십시오.

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

81

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

·본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.

·다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.

·다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.

·다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..