

◆治療痔瘡，首先應由排便管理開始。便秘將於排便時造成疼痛，也是造成痔瘡症狀惡化的原因之一。■PRESER漢方內服藥以溫和的排便作用幫助排泄，促進患部血液循環，緩解痔瘡症狀。●易於服用的細微顆粒漢方配方「乙字湯」。

## 療效或效果

體力中等以上，糞便乾硬、有便秘傾向的下列各種症狀：痔核（疣痔）、肛裂、便秘、輕度脫肛

## 用法及用量

請將以下用量1天3次，於餐前或餐與餐之間用冷水或微溫水服用：

成人（15歲以上），1天3次，1次1包

7～14歲，1次2/3包

4～6歲，1次1/2包

2～3歲，1次1/3包

未滿2歲，1次1/4包

餐與餐之間服用時，大約為餐後2～3小時。

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

未滿1歲的嬰兒應以接受醫師診治為優先，僅限於不得已的情況下服用

## 成分及分量

1天用量（2.0 g × 3包）中

Otsujito Extract 3.4g (Extracted from 3.0 g of Japanese Angelica Root, 2.5 g of Bupleurum Root, 1.5 g of Scutellaria Root, 1.0 g of Glycyrrhiza, 0.75 g of Cimicifuga Rhizome, and 0.5 g of Rhubarb )

## 添加劑

Magnesium aluminometasilicate ,Hypromellose,Lactose ,Corn starch ,flavor

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

●下列的人請勿服用

未滿3個月的嬰兒。

服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

其他瀉下藥（瀉藥）

哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

### 諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

身體虛弱的人（體力衰弱的人、體弱的人）。

胃腸弱，容易腹瀉的人。

年長者。

之前曾因藥品等，引發發疹·發紅·發癢等的人。

有下列症狀的人。

浮腫

接受過下列診斷的人。

高血壓

心臟病

腎臟病

服用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止服用並攜帶本文件諮詢醫生或藥劑師

皮膚：

發疹、發紅

發癢

消化器官：

噁心

嘔吐

食欲不振

伴隨劇烈腹痛的腹瀉

腹痛

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短·呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

假性醛固酮增多症、肌肉病變：除了手腳乏力、痠麻、抽筋感和僵硬之外，出現無力感、肌肉疼痛，且症狀漸漸變嚴重。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
腹瀉

服用1個月左右（肛裂、便秘則為服用5~6天）症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

●長期連續服用的情況下，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

本藥劑含天然成分，因此產品色調可能有所不同，但藥效不變。

單包分次服用時，請將袋口反折保管並於2天內服用完畢。

請勿使用超過使用期限的產品。

81

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。