

반복되는 엉덩이^(肛門)의 가려움에



MUZUCOOL

제2류 의약품(일반의약품) <치질용 외용제>

- ◆ PRESER MUZUCOOL 클로르페니라민 말레산염, 염산리도카인 등 5종의 유효성분을 배합한 상쾌한 사용감의 연고로 치질의 가려움과 통증에 효과가 있습니다.
- ◆ 발림성이 매끄럽고 끈적거리지 않는 수분젤이 환부에 밀착됩니다.



사용상의 주의사항



상담



- 1 다음 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.
(1)의사에게 치료를 받고 있는 사람.
(2)약물 등에 의해 알레르기 증상을 발현한 적이 있는 환자.
- 2 사용 후 다음과 같은 증상이 발현한 경우에는 이상반응일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움증, 부종
기타	자극


- 3 10일 정도 사용해도 증상이 개선되지 않을 시에는 사용을 중단하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

효능

치핵 · 치열(항문열상)의 가려움 · 부증 · 통증 · 출혈의 완화 및 소독

용법 용량

적당량을 취해 하루 1~3회 항문에 바릅니다.



<튜브에 구멍 뚫는 방법>

캡을 뒤집어 돌기부를 튜브 끝에 강하게 눌러서 밀어넣으십시오.

★사용 전에 목욕을 하거나 미온수로 환부를 씻어 청결하게 하십시오. 또 아침에는 배변 후, 밤에는 취침 전에 사용하면 더욱 효과적입니다.

[주의]

- (1) 지정된 용량 및 용법을 반드시 준수하십시오.
- (2) 어린이가 사용할 때는 보호자의 지도 감독 하에 사용하십시오.
- (3) 항문에만 사용하십시오.
- (4) 사용감은 개인에 따라 다릅니다.피부, 점막 등이 민감한 사람은 청량감을 강하게 느낄 수 있으므로 먼저 소량으로 시험해 보십시오.

성분

100g 중

성분	분량
클로르페니라민말레산염	0.2g
L-멘톨	0.1g
염산리도카인	3g
염산테트라히드로졸린	0.05g
벤잘코늄염화물	0.05g

첨가물: 카복시비닐폴리머, 폴리옥시에틸렌 경화피마자유, pH 조절제, 에탄올

보관 및 취급상의 주의사항

- (1) 밀봉하여 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- (4) 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또 개봉 후에는 사용기한이 남아 있어도 가능한 한 빨리 사용하십시오. (품질 유지를 위해)



【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.