

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	プリザエース注入軟膏T
2	成分・分量	1個(2g)中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg 塩酸テトラヒドロゾリン 1mg リドカイン 60mg l-メントール 10mg アラントイン 20mg トコフェロール酢酸エステル 60mg クロルヘキシジン塩酸塩 5mg
3	用法・用量	[注入する場合] 容器先端部を肛門部に挿入し、全量を注入してください。 15才以上 1回1個 1日1～3回、15才未満 使用しないこと [塗布する場合] 次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、 注入には使用しないでください。 15才以上 1回適量 1日1～3回、15才未満 使用しないこと
4	効能・効果	(注入時)：きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和 (塗布時)：きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和及び消毒
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)患部が化膿している人。 2. 長期連用しないでください 3. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。