

## PRESER ACE SUPPOSITORIES T

- ◆PRESER ACE SUPPOSITORIES T는 고통스러운 통증 및 갑작스런 출혈을 수반하는 치질의 통증을 억제하는 리도카인, 출혈을 억제하는 테트라하이드로졸린, 염증을 억제하는 히드로코르티손아세테이트 등의 유효 성분이 작용하여 뛰어난 효과를 발휘합니다.
- ◆시원하고 기분 좋은 사용감입니다.

### 효능

치열(열항) 및 수치질의 통증, 출혈, 부종, 가려움증의 완화

### 용법 및 용량

다음의 양을 항문 안에 주입하십시오.

15 세 이상, 1 회 1 개, 1 일 1~3 회

15 세 미만, 사용하지 말 것

★사용하기 전에 입욕을 하거나 미지근한 물로 환부를 청결히 한 후, 아침일 경우는 배변 후에, 밤일 경우는 자기 전에 사용하면 더욱 효과적입니다.

### 주의

- 정해진 용법 및 용량을 엄수해 주십시오.
- 본제가 부드러운 경우에는 잠시 식힌 후에 사용하십시오. 또한, 지나치게 딱딱할 경우는 부드러워진 후에 사용하십시오.
- 항문에만 사용하십시오.

### 성분

1 개 (1.65g)중

하이드로코르티손 아세테이트 5mg

염산테트라하이드로졸린 1mg

리도카인 60mg

l-멘톨 10mg

알란토인 20mg

초산토코페롤 60mg

클로르헥시딘염산염 5mg

### 첨가물

카르복시비닐폴리머, 무수 규산, 글리세릴스테아레이트, 경질 지방

### 사용상의 주의

#### 해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽습니다)

●다음에 해당하는 사람은 사용하지 마십시오

본제 또는 본제의 성분 클로르헥시딘에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.  
환부가 곪은 사람.

●장기간 계속해서 사용하지 마십시오

#### 상담할 내용

●다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

●사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

피부: 발진·발적, 가려움, 부종

기타: 자극감, 화농

●드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

쇼크(아나필락시스): 사용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉰소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다

- 10 일간 정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우는 사용을 중단한 후, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오

### 보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 30°C 이하인 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 보관할 경우는 좌제의 끝부분을 아래쪽으로 향해 겹상자에 넣고, 상자 표시에 따라 세워서 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다)
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.(품질유지를 위하여)

41

#### 【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.