

## プリザS坐剤

指定第二类医薬品  
痔疾用外用薬

◆プリザS坐剤は、炎症をおさえるヒドロコルチゾン酢酸エステルなど、痔の治療に効果的な成分が配合されています。これらの成分が作用し、痔の症状である痛み・出血・はれ・かゆみを緩和します。

## 効能・効果

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和

## 用法・用量

次の量を肛門内に挿入してください。

15才以上、1回1個、1日1～3回

15才未満、服用しないこと

ご使用前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、朝の場合は排便後に、夜の場合は寝る前に使用すると一層効果的です。定められた用法・用量を厳守してください。

本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。

また、硬すぎる場合には、しばらく室温に放置し、軟らかくなった後に使用してください。

肛門にのみ使用してください。

## 成分及び分量

1個（1.65g）中

ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg

リドカイン 60mg

l-メントール 9mg

アラントイン 10mg

トコフェロール酢酸エステル 50mg

クロルヘキシジン塩酸塩 5mg

## 添加物

カルボキシビニルポリマー、無水ケイ酸、ハードファット

## 使用上の注意

## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

●次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
患部が化膿している人。

●長期連用しないこと

## 相談すること

●次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

はれ

その他：

刺激感

化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

ショック（アナフィラキシー）：使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください

小児の手のとどかない所に保管してください。

保管する場合は、坐剤の先を下に向けて外箱に入れ、外箱のマークに従って立てて保管してください

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。（品質保持のため）

**【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】**

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。