

PRESER S SUPPOSITORIES

指定第二類醫藥品
痔疾用外用藥

◆PRESER S栓劑含具消炎作用的hydrocortisone acetate等治療痔瘡有效成分的配方。前述成分發揮作用，舒緩痔瘡的疼痛、出血、腫脹、搔癢症狀。

療效或效果

舒緩肛裂、疣痔的疼痛、出血、腫脹、搔癢

用法及用量

請將以下用量插入肛門內：

15歲以上，1天1~3次，1次1粒

未滿15歲者，請勿服用

請於入浴後或以溫水清潔患部後再行使用。早晨排便後或夜間入睡前使用將使效果更佳

請務必遵守規定用法、用量。

如本藥劑過軟時，請將其暫時冷卻後再行使用。

此外，藥劑過硬時則暫時置於室溫下，待其軟化後再行使用。

僅供肛門部位使用。

成分及分量

1粒(1.65g)中

Hydrocortisone acetate 5mg

Lidocaine 60mg

l-Menthol 9mg

Allantoin 10mg

Tocopherol Acetate 50mg

Chlorhexidine Hydrochloride 5mg

添加劑

Carboxyvinyl polymer, anhydrous silicic acid, Hard fat

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用)

●下列的人請勿使用

曾因本藥劑或本藥劑成分chlorhexidine引發過敏症狀者。

患部正在化膿的人。

●請勿長期連續服用

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

腫脹

其他：

刺激感

化膿

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克（過敏性）：使用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

使用10天左右症狀仍未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低且溫度30℃以下的陰涼處保管

請置於兒童無法觸及之處保管。

保管之際，請將塞劑前端朝下收入外盒後遵照外盒箭頭指示直立保管

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿使用超過使用期限的產品。

此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。