

# PRESER S OINTMENT

지정제2류의약품  
치질용 외용약

◆PRESER S 연고는 염증을 억제하는 Hydrocortisone acetate 등 치질 치료에 효과적인 성분이 포함되어 있습니다. 이들 성분이 작용하여 치질 증상인 통증, 출혈, 부음, 가려움을 완화합니다. ■시원하고 기분 좋은 사용감입니다.

## 효능 또는 효과

열혈·수치질의 통증, 출혈, 부종, 가려움증의 완화

## 용법 및 용량

적당량을 덜어, 1일 1~3회, 항문부에 바르십시오.

사용하기 전에 입욕을 하거나 미지근한 물로 환부를 청결히 한 후, 아침일 경우는 배변 후에, 밤일 경우는 자기 전에 사용하면 더욱 효과적입니다.

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하게 할 것.

본제는 항문에만 사용하십시오.

## 성분 및 분량

In 100 g

Hydrocortisone acetate 0.3g

Phenylephrine hydrochloride 0.15g

Dibucaine Hydrochloride 0.3g

Diphenhydramine Hydrochloride 0.5g

l-Menthol 0.2g

Allantoin 1g

Tocopherol Acetate 1g

Chlorhexidine Hydrochloride 0.2g

## 첨가물

BHT,Dimethylpolysiloxane ,Palmitic acid dextrin,Petrolatum,synthesis Squalane,Medium-chain fatty acid triglyceride

## 사용상의 주의

### 해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

●다음에 해당하는 사람은 사용하지 말 것

본제 또는 본제의 성분 Chlorhexidine에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

환부가 긁은 사람.

●장기간 연용하지 않을 것

### 상담할 내용

●다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

사용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용일 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사 또는 약사와 상담하십시오.□

피부:

발진·발적

가려움

부음

기타:

자극감

화농

드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

쇼크(아나필락시스): 사용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목천소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.

10일간 정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우는 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

## 보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 뚜껑을 닫은 채 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.(품질유지를 위하여)

**【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】**

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..