

PRESER S CREAM

- ◆PRESER S CREAM 는 염증을 억제하는 Hydrocortisone acetate 등 치질 치료에 효과적인 성분이 배합되어 있습니다. 이들 성분이 작용하여 치질 증상인 통증, 출혈, 부음, 가려움을 완화합니다.
- ◆시원하고 기분 좋은 사용감입니다.

효능

열항·수치질의 통증, 출혈, 부종, 가려움증의 완화 및 소독

용법 및 용량

적당량을 덜어, 1 일 1~3 회, 항문부에 바르십시오.

★사용하기 전에 입욕을 하거나 미지근한 물로 환부를 청결히 한 후, 사용하십시오. 또, 아침의 경우에는 배변 후에, 밤의 경우에는 자기 전에 사용하면 더욱 효과적입니다.

주의

- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 어린이가 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 아래 사용하게 할 것.
- 항문부에만 사용할 것.

튜브 구멍 뚫는 방법

- 뚜껑을 거꾸로 해서 돌기부를 튜브 끝에 강하게 눌러 주십시오.

성분

In 100g

하이드로코르티손 아세테이트 0.3g

리도카인 염산염 3g

l-멘톨 0.1g

초산토코페롤 1g

세틸피리디늄클로라이드 0.2g

첨가물

스테아릴알코올, 세탄올, 1,3-부틸렌글리콜, 중쇄지방산 트리글리세라이드, 소르비탄스테아레이트, 자기유화형 스테아린산 글리세린, 폴리소르베이트 60, BHT, 디메틸폴리실록산, 구연산, 구연산나트륨, 에데트산 나트륨

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

- 다음에 해당하는 사람은 사용하지 마십시오.
환부가 깊은 사람.

- 장기간 연용하지 않을 것

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

- 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

피부: 발진·발적, 가려움, 부음

기타: 자극감, 화농

- 10 일간 정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우는 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 뚜껑을 닫은 채 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.(품질유지를 위하여)

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.