

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リアップリジェンヌプラス
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 1.0g パンテノール 1.0g ピリドキシン塩酸塩 0.05g トコフェロール酢酸エステル 0.08g l-メントール 0.3g
3	用法・用量	成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)未成年者(20歳未満)。 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。 (4)妊娠、出産に伴い脱毛している人。 (5)避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。 (6)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 (7)頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。 (8)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 (9)頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。 (10)男性。 2. 次の部位には使用しないでください (1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 (2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。 3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。 4. 次に該当する人はお申し出ください • 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 • 高血圧の人、低血圧の人。 • 心臓又は腎臓に障害のある人。 • むくみのある人。 • 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。 • 高齢者(65歳以上)。 • 次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。