

RiUP
Regenne
Plus

リアップリジェンヌ
プラス

セルフチェック シート

第1類医薬品

RiUP
Regenne

リアップリジェンヌ

リアップリジェンヌシリーズのご購入は、薬剤師が承ります。
「セルフチェック」をされた後、このシートを薬剤師までお持ちください。

リアップリジェンヌシリーズを ご購入のお客様へ

本剤は、ミノキシジルを有効成分とする発毛剤です。
正しくお使いいただくため、次のことをお守りください。

- ★ご購入の前に、裏面のチェックシートで壮年性脱毛症のセルフチェックを行ってください。
- ★次の場合は本剤を使用しないでください。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 男性（男性の方はリアップシリーズの男性用製品をご使用ください）。
- 未成年者（20歳未満）。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。
- 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人。
- 原因のわからない脱毛症の人。
- 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
- 頭皮にきず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある場合。

- ★次の方は本剤のご購入前に必ず医師又は薬剤師にご相談ください。

- 高血圧・低血圧で現在治療中の方。
- 狭心症等、心臓に障害のある方。
- 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）の方。

- ★商品を選択する上でわからない点がありましたら必ず薬剤師にご相談ください。

リアップリジェンヌシリーズを 使用しているときのご注意

★以下のような場合には、ご使用を中止し、
医師又は薬剤師にご相談ください。

- 頭皮に発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等の症状があらわれた場合。
*頭皮以外にあらわれることもあります
- 頭痛が起きた場合。
- 胸の痛みがでたり、心拍が速くなったり、気が遠くなったり、めまいが起きた場合。
- 原因のわからない急激な体重増加がみられた場合。
- 手足がむくんだ場合。
- 脱毛状態の悪化や、頭頂部だけでなく側頭部や後頭部などの頭部全体の脱毛、頭髮以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛などがみられた場合。

- ★ご使用に際しては添付の説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号

大正製薬(株)お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～17:00（土、日、祝日を除く）

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

リアップリジェンヌシリーズ セルフチェックシート

☐ 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。	☐ チェックがある	A 使用せずに医師又は薬剤師にご相談ください。
↓ ☐ チェックがない		
☐ 男性である。	☐ チェックがある	B 「リアップリジェンヌシリーズ」は女性用です。男性の方はリアップシリーズの男性用製品のチェックシートをご利用ください。
↓ ☐ チェックがない		
☐ 20歳未満である。	☐ チェックがある	C 使用せずに医師又は薬剤師にご相談ください。(国内での使用経験がありません。)
↓ ☐ チェックがない		
☐ 妊婦又は妊娠していると思われる、又は授乳中である。	☐ チェックがある	D 使用せずに医師又は薬剤師にご相談ください。(妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。)
↓ ☐ チェックがない		
☐ 妊娠、出産に伴い脱毛している。 ☐ 避妊用ピルの使用をやめたことで脱毛している。 ☐ 頭髮が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部分が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。 ☐ 頭髮以外の体毛(まゆ毛など)が脱毛している。 ☐ 急激なダイエットにより脱毛してきた。 ☐ 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している。 ☐ 急激に脱毛している。 ☐ 髪を頭皮から強く引っ張るような髪型により脱毛している。	☐ 1つでもチェックがある	E 使用しないでください。壮年性脱毛症以外の要因による疾患の可能性がありますので、医師又は薬剤師にご相談ください。
↓ ☐ チェックがない		
☐ 頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。	☐ チェックがある	F きず、湿疹あるいは炎症(発赤)を治してから再確認してください。(きず等を悪化させることがあります。)
↓ ☐ チェックがない		
☐ 右図よりも脱毛している。  ☐ 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。	☐ 1つでもチェックがある	G 使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)
↓ ☐ チェックがない		
☐ 高血圧・低血圧で現在治療を受けている。 ☐ 狭心症等、心臓に障害がある。	☐ 1つでもチェックがある	H 使用を控えることをおすすめします。使用する場合は、 必ず 医師又は薬剤師にご相談ください。(本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
↓ ☐ チェックがない		
☐ 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。	☐ チェックがある	I 使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。(甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。)
↓ ☐ チェックがない		
☐ 薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある。 ☐ 高血圧又は低血圧である。 ☐ 心臓や腎臓に障害がある。 ☐ むくみがある。	☐ 1つでもチェックがある	J 使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。(副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
↓ ☐ チェックがない		
上記のいずれにも該当しない。 または該当したG~Jについて医師又は薬剤師に相談済みである。さらに以下の点を確認した。 次の方は、購入前に必ず医師又は薬剤師にご相談ください。 ● 高血圧・低血圧で現在治療中の方 ● 狭心症等、心臓に障害のある方		
↓ ☐ はい		
K 薬剤師に説明を受け、使用上の注意や商品パッケージに記載された事項をよくお読みになり、ご購入ください。		

効能・効果 壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

用法・用量 成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する。

成分・分量 **リアップリジェンヌプラス**
 100mL中 ミノキシジル 1.0g、パンテノール 1.0g、
 ビリドキシン塩酸塩 0.05g、
 トコフェロール酢酸エステル 0.08g、l-メントール 0.3g
 添加物: 1,3-ブチレングリコール、グリセリン、エタノール、
 ジブチルヒドロキシトルエン、ニコチン酸アミド、グリシン、
 L-アルギニン、ヒアルロン酸Na

リアップリジェンヌ

ミノキシジル 1.0g、パンテノールエチルエーテル 1.0g、
 トコフェロール酢酸エステル 0.08g、l-メントール 0.3g
 添加物: 1,3-ブチレングリコール、クエン酸、エタノール、
 ヒアルロン酸Na

☐ 65歳以上の方へ：一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。
☐ ご不明点やお手伝いが必要なことがあれば、薬剤師にご相談ください。