

ご購入前に、チェックしてみましょう

あてはまる

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。..... A 使用しないでください。
 - 20歳未満である。..... B 使用しないでください。(国内での使用経験がありません。)
 - 妊婦又は妊娠していると思われる、又は授乳中である。 C 使用しないでください。(妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。)
 - 妊娠、出産に伴い脱毛している。 D
 - 避妊用ピルの使用をやめたことで脱毛している。 E
 - 頭髪が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部分が円形や橢円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。 F
 - 頭髪以外の体毛(まゆ毛など)が脱毛している。 G
 - 急激なダイエットにより脱毛してきた。 H 使用しないでください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)
 - 頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している。 I
 - 急激に脱毛している。 J
 - 髪を頭皮から強く引っ張るような髪型により脱毛している。 K
 - 男性である。 L 使用しないでください。(本品は女性用です。男性の方はアップシリーズの男性用製品をご使用ください。)
 - 頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。 M きず、湿疹あるいは炎症(発赤)を治してから再確認してください。(きず等を悪化させることができます。)
-
- 右図よりも脱毛している。 N 使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)
 - 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。 O
 - 高血压・低血压で現在治療を受けている。
狭心症等、心臓に障害がある。 P 使用を控えられることをおすすめします。使用する場合は、必ず医師又は薬剤師に相談してください。(本剤は血压に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
 - 薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある。高血压又は低血压である。心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。 Q 使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。(副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
 - 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。 R 使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。(甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。)

上記のいずれにも該当しない、または、チェックのついた
N～Rについて相談済みである。 S

ご購入いただけます。使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みください。

- 65歳以上の方へ:一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。
- ご不明点は、薬局・薬店の薬剤師または大正製薬119番室までご相談ください。