

# RiUP Regenne

RiUP regenne 为对于女性的早年秃发，其效能、效果已被认可的“医药品”。着眼于女性的头皮，在 minoxidil 生发成分上加了整顿头皮环境的成分。

## 功效及效果

用于早年秃发的生发、育发以及预防持续脱发（掉发）。

## 用法及用量

成年女性（20 岁以上）请按 1 天 2 次、1 次 1mL 涂抹在脱发的头皮部位。

与脱发范围的大小无关，请遵守 1 次使用 1mL。1mL 是作为如果涂抹开，头皮整体都会充分涂抹到的量设计的。

此外，容器可以计量 1mL。

### 注意

- 即使超过规定用法用量的范围大量使用或频繁使用，效果也不会更好。请严格遵守规定的用法用量。（即使超过规定量大量使用，效果几乎不会更好，反而出现副作用的可能性会变高。）
- 注意不要入眼。不慎入眼时立即用冷水或温水进行清洗。症状严重时应前往眼科就诊。
- 用粘着药液的手触摸眼睛等粘膜会有刺激，粘在手上的药液请仔细洗掉。
- 长头发的人使用时，请把头发分开，药液不要弄到头发上而仔细涂抹在头皮上。
- 请注意不要粘在有可能溶化于乙醇等的物品（眼镜框、化学纤维等）。
- 请在使用本药剂之后再使用整发液以及整发喷剂。
- 使用染发剂（染色、染发、染白发等）时，请在染色完全结束后使用本药剂。
- 接发或戴假发的人，请充分弄干本药剂后再戴上。

## 成分及分量

100mL 中

米诺地尔 1.0g

泛醇乙醚 1.0g

生育酚乙酸酯 0.08g

l-薄荷醇 0.3g

### 添加剂

1,3-丁二醇，柠檬酸，乙醇，透明质酸钠

## 使用注意事项

### 禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用。

#### ● 下述人群请不要使用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。

未成年人群（未满 20 岁）。

在国内没有使用经验。

孕妇或有其可能性的人群，以及处于哺乳期的人群。

对于孕期的使用，其安全性没有被充分验证。此外，minoxidil 会转移到母乳中。

因怀孕、分娩引起脱发的人群。

早年秃发以外的脱发症的可能性较高。

因停止服用口服避孕药而引起脱发的人群。

早年秃发以外的脱发症的可能性较高。

早年秃发以外的脱发症（例如，甲状腺疾病、急剧的减肥、斑秃等）的人，或不明原因的脱发症人群。

本药剂仅对早年秃发有效。

不仅是头顶部位，头部整体包括头侧部位及后脑部位均有脱发的人群。

有可能是相比男性在女性中多见的因甲状腺疾病引起的脱发等，早年秃发以外的脱发症或脱发因其他原因引起。

急速脱发或头发呈斑状脱落的人群。

早年秃发以外的脱发症的可能性较高。

因头皮被强拉的发型引起脱发的人群。

早年秃发以外的脱发症的可能性较高。

男性。

男性请使用 RiUP 系列的男性用产品。

●请不要用于下述部位

本药剂仅限用于头皮部位，请勿内服。

有可能使血压下降等。

有伤口、湿疹或炎症（发红）等症状的头皮。

有可能使伤口等加重。

- 使用本药剂时，请避免使用其他生发剂以及外用药（软膏、液体剂等）。此外，使用这些药剂时请停止使用本药剂。这些药剂有可能对本药剂的吸收产生影响。

### 咨询事项

- 下述人群在使用前，请咨询医生或药剂师

曾经因药物或化妆品等出现过过敏症状（例如，起疹发红、发痒、斑疹等）的人群。

高血压人群、低血压人群。

本药剂有可能对血压产生影响。

有心脏或肾脏疾病的人群。

本药剂有可能对心脏以及肾脏产生影响。

有浮肿的人群。

有可能加重浮肿。

家族、兄弟姐妹中没有早年秃发的人。

对于早年秃发的发病，认为遗传性因素较大。

老年人（65 岁以上）。

一般在老年人身上会容易出现不好的症状。

接受下述诊断的人群。

甲状腺功能障碍（甲状腺功能减退症、甲状腺功能亢进症）。

可能因为甲状腺疾病引起脱发。

- 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

皮肤：头皮的起疹和发红\*、发痒、斑疹、头皮屑、使用部位的发热等

\*：有时也会出现在头皮以外的部位。

精神神经系统：头痛、神志不清、头晕

循环系统：胸痛、心率加快

代谢系统：不明原因体重急剧增加、手脚肿胀

- 使用 6 个月以后，下述的任何症状都没有改善时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

脱发状态的程度、长出胎发软发、长出硬发、脱发的程度。（不仅是粗发，细短脱发的减少也是改善的目标。）

有可能是相比男性在女性中多见的因甲状腺疾病引起的脱发等，早年秃发以外的脱发症或脱发因其他原因引起。

- 即使在开始使用后的 6 个月以内，如果出现脱发状态的恶化或下述的脱发现状，请停止使用，并携带本说明书咨询医生或药剂师

不仅是头顶部位、头部整体包括头侧部位及后脑部位均有脱发，除头发以外的掉毛、斑状脱发、急剧的脱发等。

有可能是相比男性在女性中多见的因甲状腺疾病引起的脱发等，早年秃发以外的脱发症或脱发因其他原因引起。

### 其他注意事项

- 毛发的成长需要时间。请每天使用至少 6 个月，直到确定效果。

本药剂被认定使用 6 个月后生效。

- 毛发成长的程度因人而异，本药剂并非对任何人都有效果。

- 要维持效果必须继续使用，如果停止使用会逐渐恢复原来的状态。

本药剂并不能清除早年秃发的原因。

### 保管及使用注意事项

- 使用后盖好盖子，避开阳光直射或高温、寒冷的场所，置于阴凉场所保管。

- 请保管在儿童无法触及的地方。

- 为了避免误用，并保证质量，请不要移至其他容器中。

- 请勿靠近烟火。

- 请勿使用超过使用期限的产品。

21

#### 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。

- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。

- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。

· 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。