

リアップリジェンヌご購入前チェック

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある。	A	使用しないでください。	
20歳未満である。	B	使用しないでください。(国内での使用経験がありません。)	
妊婦又は妊娠していると思われる、又は授乳中である。	C	使用しないでください。 (妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。)	
妊娠、出産に伴い脱毛している。	D	使用しないでください。 (壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)	
避妊用ピルの使用をやめたことで脱毛している。	E		
頭髮が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部位が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。	F		
頭髮以外の体毛(まゆ毛など)が脱毛している。	G		
急激なダイエットにより脱毛してきた。	H		
頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している。	I		
急激に脱毛している。	J		
髪を頭皮から強く引っ張るような髪型により脱毛している。	K		
男性である。	L		使用しないでください。 (本品は女性用です。男性の方はリアップシリーズの男性用製品をご使用ください。)
頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。	M		きず、湿疹あるいは炎症(発赤)を治してから再確認してください。(きず等を悪化させることがあります。)
右図よりも脱毛している 	N	使用しないか、使用する前に医師又は薬剤師に相談してください。 (壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)	
家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はいない。	O		
高血圧・低血圧で現在治療を受けている。狭心症等、心臓に障害がある。	P	使用を控えられることをおすすめします。使用する場合は、 必ず 医師又は薬剤師に相談してください。 (本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。)	
薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある。高血圧又は低血圧である。心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。	Q	使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。	
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。	R	使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。 (甲状腺疾患による脱毛の可能性あります。)	
上記のいずれにも該当しない。 または、チェックのついたN~Rについて医師又は薬剤師に相談済みである。	S	ご購入いただけます。 使用上の注意や製品パッケージに記載された事項をよくお読みください。	

●65歳以上の方へ:一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなるため、使用する前に、医師又は薬剤師に相談してください。