

## 医薬品を正しく購入するための

## 説明文書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	リアップリジエンヌ
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 1.0g パントテニールエチルエーテル 1.0g トコフェロール酢酸エステル 0.08g ノメントール 0.3g
3	用法・用量	成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)未成年者(20歳未満)。 (3)妊娠又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の 人。 (4)妊娠、出産に伴い脱毛している人。 (5)避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。 (6)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 (7)頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。 (8)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。 (9)頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。 (10)男性。</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 (2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。</p> <p>3. 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使 用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してく ださい。</p> <p>4. 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"><li>今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こした ことがある人。</li><li>・高血圧の人、低血圧の人。</li><li>・心臓又は腎臓に障害のある人。</li><li>・むくみのある人。</li><li>・家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。</li><li>・高齢者(65歳以上)。</li><li>・次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。</li></ul>
6	薬剤師が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。