

RiUP Regenne為對於女性早年禿髮的效用、效果獲得認證的「藥品」。添加針對女性頭皮作用的有效成分minoxidil以及調整頭皮環境的成分配方。□

療效或效果

用於早年禿髮的生髮、育髮及預防持續禿髮（掉髮）

用法及用量

成年女性（20歲以上），每日2次，每次1mL，塗抹於禿髮的頭皮之上。

無論禿髮範圍大小，請遵守每次1mL的使用量。以1mL用量延展即可充分塗抹於全頭皮的藥量設計。

此外，容器為可取用1mL的款式。

即使以超出規定用法、用量的範圍使用或頻繁使用效果並不變。請務必遵守規定用法、用量。

（即使超出規定用量使用，不僅效果不變，更將造成副作用產生的可能性增加）

頭髮較長者，請將頭髮撥開，將藥劑仔細塗抹於頭皮，避免沾染頭髮。

如沾附藥劑的雙手接觸眼睛等黏膜部位將造成刺激，因此請將沾附於雙手的藥劑徹底洗淨。

請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情況下，請接受眼科醫師的診療。

請避免與可能受酒精成分溶解之物（眼鏡框、化學纖維等）接觸。

造型劑及美髮造型噴霧請於使用本藥劑後使用。

使用染髮劑（造型染髮、染髮、染白髮等）時，請於染髮流程完全結束後再行使用。

使用接髮或部分假髮者，請於本藥劑充分乾燥後再行配戴。

成分及分量

100mL中

Minoxidil 1.0g

Pantothenyl ethylether 1.0g

Tocopherol Acetate 0.08g

l-Menthol 0.3g

添加劑

1,3-Butylene glycol,citric acid,Anhydrous ethanol,Sodium hyaluronate

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

符合下列情形者請勿使用。

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

未成年人（未滿20歲）。

於日本國內未有使用經驗。

懷孕或可能懷孕以及哺乳中的婦女。

懷孕期間使用本藥劑的安全性尚未獲得充分驗證。此外，minoxidil成分會轉移到乳汁內。

因懷孕或生產而引起禿髮者。

屬於非早年禿髮的禿髮症可能性較高時。

因停止服用口服避孕藥而引起禿髮者。

早年禿髮以外的禿髮症者（例如：甲狀腺疾病、過度節食、斑禿等）或原因不明的禿髮症者。

本藥劑僅對早年禿髮有效。

不僅是頭頂部位，頭部全體包括頭側及後枕部位均有禿髮者。

與男性相較，女性禿髮問題常為甲狀腺疾病所造成等，可能屬於早年禿髮以外的禿髮症或其他因素所造成的禿髮。

急速禿髮，頭髮呈斑狀脫落者。

屬於非早年禿髮的禿髮症可能性較高時。

因強烈拉扯頭皮的髮型而導致禿髮者。

屬於非早年禿髮的禿髮症可能性較高時。

男性。

男性請使用RiUP系列男性專用產品。

請勿用於下列部位。

本藥劑僅供頭皮使用，請勿內服。

可能造成血壓下降等。

出現傷口、濕疹或發炎症狀（發紅）等的頭皮。

可能造成傷口惡化。

使用本藥劑時，請避免於頭皮使用其他生髮劑或外用藥（軟膏、液劑等）。另外，如使用以上藥劑時，請停止使用本藥劑。

該藥劑可能影響本藥劑的吸收效果。

諮詢事項

符合下列情形者請在使用前諮詢醫師或藥劑師

曾因藥物或化妝品等引發過敏症狀者（例如：出疹、發紅、搔癢、斑疹等）。

高血壓者、低血壓者。

本藥劑可能對血壓造成影響。

罹患心臟或腎臟疾病者。

本藥劑可能對心臟及腎臟造成影響。

浮腫者。

可能造成浮腫症狀加重。

家族及兄弟姐妹中並無早年禿髮者。

造成早年禿髮的主因可能為遺傳。

老年人（65歲以上）。

一般而言老年人容易出現不適症狀。

受診斷為患有下列疾病者。

甲狀腺機能障礙（甲狀腺機能低下症、甲狀腺機能亢進症）。

可能因甲狀腺疾病而造成禿髮。

使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師

皮膚：頭皮出疹、發紅*、搔癢、斑疹、頭皮屑、使用部位的灼熱感等

精神神經系統：頭痛、意識模糊、暈眩

循環器官：胸痛、心跳速度加快

代謝系統：原因不明的體重急速增加、四肢浮腫

*：可能出現於頭皮以外的部位。

使用6個月後，下列任一症狀未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。

與男性相較，女性禿髮問題常為甲狀腺疾病所造成等，可能屬於早年禿髮以外的禿髮症或其他因素所造成的禿髮。

禿髮狀態程度、生髮或細軟髮生長、粗硬髮生長、掉髮程度（粗硬髮之外，細軟短髮的掉髮亦有所減少即可視為獲得改善）。

即使於開始使用後的6個月內，如禿髮狀態惡化或發生下列禿髮現象時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。

不僅是頭頂部位，頭部全體包括頭側及後枕部位均有禿髮者、頭髮以外的掉毛、毛髮呈斑狀脫落者、急速毛髮脫落等。

與男性相較，女性禿髮問題常為甲狀腺疾病所造成等，可能屬於早年禿髮以外的禿髮症或其他因素所造成的禿髮。

■其他注意事項

毛髮生長需要一段時間。感受效果最短需要6個月，因此請每日持續使用。

本藥劑有效性為使用6個月之後出現。

毛髮生長程度因人而異，本藥劑並非對所有使用者皆有效。

為了維持效果，必須持續使用，如停止使用可能逐漸恢復原本狀態。

本藥劑並非解決早年禿髮原因的藥物。

保管及使用上的注意事項

使用後，請旋緊瓶蓋，避免日光直射、高溫、寒冷之處，置於陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

為避免誤用並確保品質，請勿換裝於其他容器。

請遠離火源。

請勿服用超過使用期限的產品。

33

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。