

リアップX5プラスネオ

第一類医薬品
壮年性脱毛症における発毛剤

◆有効成分ミノキシジルを5%配合することにより、優れた発毛効果を発揮します。◆キャップを開け、頭皮に押しあてるだけで、1回量の1mLを計量できる容器です。◆ミノキシジルの他に、清涼感を与え、頭皮の発毛環境を整える、6つの有効成分※を配合しています。※ピリドキシン塩酸塩、トコフェロール酢酸エステル、l-メントール、ジフェンヒドラミン塩酸塩、グリチルレチン酸、ヒノキチオール

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防

用法・用量

成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
1回1mLのご使用は、脱毛範囲の大小に関係なくお守りください。1mLは塗り広げれば、頭皮全体に十分に行きわたる量として設計してあります。
なお、容器は1mLを計量できるタイプです。

注意

用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。
（決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります）
目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
アルコールなどに溶けるおそれのあるもの（メガネわく、化学繊維等）にはつかないようにしてください。
整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
染毛剤（ヘアカラー、毛染め、白髪染め等）を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。

成分及び分量

100mL中
ミノキシジル 5.0g
ピリドキシン塩酸塩 0.05g
トコフェロール酢酸エステル 0.08g
l-メントール 0.3g
ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.1g
グリチルレチン酸 0.1g
ヒノキチオール 0.05g

添加物

L-アルギニン、グリシン、1,3-ブチレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、リン酸、エタノール

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります）

- 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
女性。
本剤は日本人女性における安全性が確認されていないため、女性の方はミノキシジルを1%配合したリアップシリーズの女性用製品をご使用ください。
未成年者（20歳未満）。
国内での使用経験がありません。
壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。
本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。
脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。
● 次の部位には使用しないでください。
本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
血圧が下がる等のおそれがあります。
さす、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。
さす等を悪化させることがあります。
● 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。
これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
高血圧の人、低血圧の人。
本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。

心臓又は腎臓に障害のある人。

本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。

むくみのある人。

むくみを増強させる可能性が考えられます。

家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。

壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。

高齢者（65歳以上）。

一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。

次の診断を受けている人。

甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）。

甲状腺疾患による脱毛の可能性ががあります。

●使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

皮膚：頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等

精神神経系：頭痛、気が遠くなる、めまい

循環器：胸の痛み、心拍が速くなる

代謝系：原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

*：頭皮以外にあらわれることもあります。

●6か月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度（太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります）。

壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

●使用開始後6か月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

頭髮以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。

壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

その他の注意

毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも4か月間、毎日使用してください。

本剤の有効性は4か月間使用後から認められています。

毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。

効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。

本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。

保管及び取扱い上の注意

使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所をさけ、涼しい所に保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

火気に近づけないでください。

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

11

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。