

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書

第一類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	リアップX5プラスローション
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5.0g ピリドキシン塩酸塩 0.05g トコフェロール酢酸エステル 0.08g l-メントール 0.3g
3	用法・用量	成人男性（20歳以上）が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none">次の人は使用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 女性。 (3) 未成年者（20歳未満）。 (4) 壮年性脱毛症以外の脱毛症（例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等）の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。 (5) 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。次の部位には使用しないでください (1) 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。 (2) きず、湿疹あるいは炎症（発赤）等がある頭皮。本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤（軟膏、液剤等）の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください次に該当する人はお申し出ください<ul style="list-style-type: none">今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。高血圧の人、低血圧の人。心臓又は腎臓に障害のある人。むくみのある人。家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。高齢者（65歳以上）。次の診断を受けている人。 甲状腺機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症）。
6	薬剤師が必要と判断する事項	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p style="text-align: center;">〈ご使用にあたって〉</p><p>お使いになる方の髪質や1ヵ所への集中塗布などにより、ごわつき感が出たり、くし通りが悪くなったり、部分的に白くなる(成分の結晶化)ことがあります。毎日洗髪を行い、頭皮を清潔にして、用法・用量を守ってお使いください。</p></div>

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談ください。



包装	60mL
----	------

〈商品特長〉

- ◆有効成分ミノキシジルを5%配合することにより、優れた発毛効果を発揮します。
- ◆ミノキシジルの他に、清涼感を与え、頭皮の発毛環境を整える、3つの有効成分（ピリドキシン塩酸塩、トコフェロール酢酸エステル、*l*-メントール）を配合しています。
- ◆キャップを開け、頭皮に押しあてるだけで、1回量の1mLを計量できる容器です。

正确购买医药品 说明书

第一类医药品

使用前请务必阅读医药品说明书

1	名 称	RiUP X5 Plus Lotion
2	成分与规格	100mL 中 minoxidil 5.0g、pyridoxine hydrochloride 0.05g、 tocopherol acetate 0.08g、l-menthol 0.3g
3	用法与用量	成年男性（20 岁以上）以 1 天 2 次、每次 1 mL 的用量涂抹在脱发头皮上。
4	作用与效果	用于中年脱发症的生发、育发及预防持续脱发（掉发）。
5	预防卫生保健方面危害的注意事项	<p>1. 符合以下情形者请勿使用：</p> <p>(1) 曾因本药剂或本药剂的成分引起过敏症状者。</p> <p>(2) 女性。</p> <p>(3) 未成年人（未满 20 岁）。</p> <p>(4) 中年脱发症以外的脱发症患者（例如：斑秃、因甲状腺疾病引起的脱发等），或不明原因的脱发症患者。</p> <p>(5) 短时间内急速脱发，头发呈斑状脱发的人。</p> <p>2. 请勿在以下部位使用：</p> <p>(1) 本药剂仅限使用于头皮，请勿口服。</p> <p>(2) 患有外伤、湿疹或炎症（皮肤发红）等的头皮。</p> <p>3. 使用本药剂时，请勿在头皮处使用其它的育发剂及外用药剂（软膏、液剂等）。另外，如使用以上药剂，请停止使用本药剂。</p> <p>4. 符合以下情况者请告知：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 曾因药物或化妆品等的使用引起过敏症状者（例如：发疹、皮肤发红、发痒、斑疹等）。 • 高血压者、低血压者。 • 罹患心脏或肾脏疾病者。 • 浮肿者。 • 家族及兄弟姐妹中无中年脱发症者。 • 老年人（65 岁以上）。 • 诊断为以下疾病者： 甲状腺功能障碍（甲状腺功能减退症、甲状腺功能亢进症）。
6	药剂师判断为必要的说明事项	<p style="text-align: center;">〈使用时〉</p> <p>因使用者的发质或集中一处涂抹等原因，可能引起头发变硬、不易梳理、部分头发变白（药剂成分结晶）的情况。请每天洗发保持头皮清洁，并遵守建议的用法与用量。</p>

[注意事项]

1. 本说明书内容为协助顾客购买或选择医药品时的必要资讯。
2. 根据法令规定，要指导医药品必须提供相关资讯，第一类医药品除药剂师判断为不需要外也必须提供相关资讯。
3. 使用后，如有身体状况上的变化等（副作用等），请停止使用并立即向购买该药的药店药剂师咨询。



包装	60mL
----	------

〈商品特长〉

- ◆通过调制了5%的有效成分 minoxidil，更能有效发挥生发作用。
- ◆ minoxidil 之外，还调制了能带来清凉感觉、调整头皮生发环境的3种有效成分（pyridoxine hydrochloride、tocopherol acetate、*l*-menthol）。
- ◆只需打开盖子，按压在头皮上即可，此容器能自行计算每次用量（1 mL）。