




说明书

- ◆ 使用前请务必阅读本说明书。
- ◆ 如果使用本品后出现不良症状，请立即停止使用，并咨询医生或药剂师。





商品名
RiUP X5 CHARGE

1类药品

雄激素源性脱发的生发剂

3大效果X5CHARGE



8种
活性成分



7种辅助成分
有助于增强米诺地尔的效果。

RiUP X5 CHARGE为“雄激素源性脱发的生发剂”。

头发生长需要时间。在真正感觉到生发效果之前，请遵守用法用量，正确使用至少4个月。

之后为了维持脱发加剧的预防效果（防止已经开始的脱发进一步加剧的效果），建议继续使用。

雄激素源性脱发一般是指遗传性头发稀疏或掉落，经过多年逐渐加剧，进而变得更加明显的脱发。

使用注意事项

⊗ 禁止事项

若不遵守则有可能导致当前病情恶化或发生不良反应。

1 下述人群请勿使用。

- 1 因本品或本品的成分引起过过敏症状的人。
- 2 女性。
尚未确认本品在日本女性中的安全性,因此女性用户请使用含1%米诺地尔的Regenne品牌产品。
- 3 未成年人(未满20岁)。
在日本国内尚无使用经验。
- 4 非雄激素源性脱发的脱发(例如:圆形脱发、甲状腺疾病引起的脱发等)人群、或者是原因不明的脱发人群。
本品仅对雄激素源性脱发有效。
- 5 脱发急剧增加或头发脱落成斑片状的人群。
很可能是非雄激素源性脱发。

2 请勿用于下述部位。

- 1 本品仅限用于头皮,请勿内服。
可能存在血压下降等风险。
- 2 头皮有创伤、湿疹或炎症(发红)等情况。
可能会加剧创伤等情况的恶化。

- 3 使用本品时,请避免在头皮上使用其他生发剂及外用药剂(如软膏、液剂等)。使用这些药物时,请停止使用本品。
这些药物有可能会影响本品的吸收。

咨询事项

1 下述人群请在使用前咨询医生或药剂师。

- 1 曾因药物或化妆品等原因引起过过敏症状(例如:皮疹、发红、瘙痒、斑疹等)的人。
- 2 有高血压、低血压的人。
本品有可能会影响血压状况。
- 3 有心脏或肾脏损害的人。
本品有可能会影响心脏或肾脏。
- 4 有浮肿的人。
可能会加剧浮肿。
- 5 家人、兄弟姐妹中没有雄激素源性脱发的人。
发生雄激素源性脱发很有可能是遗传性因素。

6 老年人(65岁以上)。
一般来说,老年人容易出现不良症状。

7 具有以下诊断的人。
甲状腺功能障碍(甲状腺功能减退症、甲状腺功能亢进症)。
可能是甲状腺疾病引起的脱发。

2 使用后若出现下述症状,则可能存在不良反
应,请立即停止使用,并携带本说明书咨询医
生或药剂师。

相关部位	症状
皮肤	头皮皮疹、发红*、瘙痒、斑疹、头垢、 使用部位有热感等
精神神经系统	头痛、神志不清、眩晕
心血管系统	胸痛、心律加快
代谢系统	原因不明的体重骤增、手脚浮肿

*: 也可能会在头皮之外的部位出现。

3 如果使用6个月之内,以下任一情况均未得到
改善,请停止使用,并携带本说明书咨询医生
或药剂师。

脱发症状程度、出现新生毛发、软毛发、硬毛发、掉发的
程度(不仅是粗发,也可以将细短头发的掉落减少作为
改善的标准)。

有可能是非雄激素源性脱发,或者是由其他原因造成的
脱发。

4 使用开始后6个月之内,仍出现脱发症状恶化
以及出现如下脱发等情况时,请停止使用,并
携带本说明书咨询医生或药剂师。

头发之外的脱毛、斑片型脱发、急性脱发等。

有可能是非雄激素源性脱发,或者是由其他原因造成的
脱发。

其他注意事项

- 1** 毛发生长需要时间。请在出现效果前至少连续使用4个
月,且每天使用。
本品的有效性要使用4个月后才能出现。
- 2** 毛发的生长程度因人而异,本品并不对所有人都有效。
- 3** 要维持效果需要持续使用,一旦停止使用,就会慢慢恢
复原状。
本品并不能消除雄激素源性脱发的原因。

适应症

雄激素源性脱发的生发、
育发及脱发(掉发)加剧的预防。

本药品适用雄激素源性脱发

RiUP X5 CHARGE对如下类型的脱发或头发稀疏有效。



※如果脱发范围超出上述大小,则可能无效。

成分与含量 每100mL

成分	含量	作用
米诺地尔	5.0g	生发、育发及预防脱发加剧。
盐酸吡多醇	0.05g	抑制过氧化物及产生头皮屑的皮脂过剩分泌,使头皮保持健康状态。
生育酚乙酸酯	0.08g	具有防止皮脂氧化及促进血液循环的作用,使头皮保持健康状态。
L-薄荷醇	0.3g	抑制头皮瘙痒,带来清凉感。
盐酸茶海拉明	0.1g	抑制头皮瘙痒,使头皮保持健康状态。
甘草次酸	0.1g	具有消炎作用,使头皮保持健康状态。
桉木醇	0.05g	通过杀菌作用抑制头皮屑产生,使头皮保持清洁。
泛醇	1.0g	为头皮及毛细胞提供营养,使头皮保持健康状态。

辅料: L-精氨酸、二叔丁基对甲酚、甘氨酸、甘油、维生素C、磷酸、乙醇、1,3-丁二醇

用法用量

成年男性(20岁以上)请每天使用2次,
每次在脱发的头皮处涂抹1mL。

无论脱发范围大小,请按每次1mL的量使用。本品的设计是只要将1mL的量涂开,就能充分涂抹到整个头皮。此外,容器类型可以计量1mL。


注意事项

- 1 即使超出用法用量范围而大量使用,或者是频繁使用,也不会增加产品的功效。请严格遵守规定的用法用量。(即使超出规定用量使用,亦不会增加产品功效,反而可能会增加不良反应发生的可能性)
- 2 请小心不要让药物进入眼睛。万一进入眼睛,请立即用水或温水清洗。如果症状严重,请到眼科医生处就诊。
- 3 如果用沾有药液的手碰到眼睛等的黏膜后,会产生刺激,因此请将沾在手上的药液清洗干净。
- 4 请注意不要沾到可溶于酒精等物的物品(眼镜框、化学纤维等)。
- 5 请在使用本品后再使用护发品及喷雾剂。
- 6 使用染发剂(如染发用品、染发、染白发等)时,请在染发完全结束后再使用本品。

4步骤即可使用容器

1 取下盖子

将容器主体 **立起**, 慢慢地转动盖子取下。




请勿在倒放或斜放的状态下取下盖子。

(会造成药液滴出)

2 将容器倒放

将容器倒置, 使黑色 **喷嘴朝下**, 等待约3秒钟。(计量室积留药液1mL)



※蓝色为药液的示意图

3 涂抹在头皮上

首先将容器的前端 **垂直地压到头皮上**。然后, 轻敲反复涂抹(几十次)。




请以较为严重的部分为中心, 按1cm~2cm的间隔进行涂抹。

(药液充分扩散, 发挥效果)

4 拧紧盖子

药液 **完全** 喷不出来后, 拧紧盖子。



请拧紧, 使盖子和容器面保持一致。

(如果盖子未被拧紧, 下次即使倒放, 药液也不会积留在计量室中)

储存及操作注意事项

- 1 使用后请盖好盖子,避免阳光直射及高温、寒冷的场所,储存在阴凉处。
- 2 请储存在儿童触及不到的地方。
- 3 为避免误用并保证质量,请勿更换至其他容器。
- 4 请勿靠近火源。
- 5 请勿使用超过使用期限的产品。



【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。