




설 명 서

- ◆ 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어 주십시오 .
- ◆ 본 약제를 사용함에 따라 바람직하지 않은 증상이 나타난 경우에는 즉시 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오 .





판매명:
RiUP X5 CHARGE

제1류 의약품
(일반의약품)

남성형 탈모증용 발모제

세 가지 효과에 X5 CHARGE



8가지
유효 성분



7가지 지원 성분이
미녹시딜의 효과를 높입니다.



RiUP X5 CHARGE는 "남성형 탈모증용 발모제"입니다.

모발이 자라려면 시간이 걸립니다. 발모 효과를 실감하기까지
최소 4개월 동안 용법 및 용량을 지켜 올바르게 사용하십시오.

이후에는 탈모 진행 예방 효과(이미 시작된 탈모가 더 이상
진행되지 않도록 하는 효과)를 유지하기 위해서라도 계속
사용하실 것을 권장합니다.

남성형 탈모증은 일반적으로 유전성 빈모나 탈모를 말하는데
서서히 몇 년에 걸쳐 진행되면서 눈에 띄게 됩니다.

사용상의 주의사항

⊗ 금지 사항

지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용이 발생할 수 있습니다.

1 다음과 같은 사람은 사용하지 마십시오.

1 본 약제 또는 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상이 나타난 사람.

2 여성.

본 약제는 일본인 여성에 대한 안전성이 확인되지 않았으므로 여성의 경우 미녹시딜 1%를 포함한 리젠드 브랜드 제품을 사용하시기 바랍니다.

3 미성년자(20세 미만)

일본 내에서는 사용 경험이 없습니다.

4 남성형 탈모증 이외의 탈모증(예: 원형 탈모증, 갑상선 질환에 따른 탈모 등)이 있는 사람 또는 원인을 알 수 없는 탈모증이 있는 사람.

본 약제는 남성형 탈모증에 대해서만 유효합니다.

5 급격하게 탈모되거나 모발이 반점 형태로 빠진 사람.

남성형 탈모증 이외의 탈모증일 가능성이 높습니다.

2 다음 부위에는 사용하지 마십시오.

1 본 약제는 두피에만 사용하고 복용하지 마십시오. 혈압이 떨어질 수 있습니다.

2 상처, 습진 또는 염증(발적) 등이 있는 두피. 상처가 악화될 수 있습니다.

3 본 약제를 사용하는 경우 다른 육모제 및 외용제(연고, 약액 등)를 두피에 사용하지 마십시오. 다른 육모제 및 외용제를 사용할 때는 본 약제의 사용을 중단하십시오. 이러한 약제들은 본 약제의 흡수에 영향을 줄 수 있습니다.

상담이 필요한 경우

1 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.

1 이전에 약이나 화장품으로 인한 알레르기 증상(예: 발진, 발적, 가려움증, 염증 등)이 있었던 사람.

2 고혈압이 있는 사람, 저혈압이 있는 사람. 본 약제는 혈압에 영향을 줄 수 있습니다.

3 심장 또는 신장에 문제가 있는 사람. 본 약제는 심장 또는 신장에 영향을 줄 수 있습니다.

4 부종이 있는 사람. 부종이 심해질 수 있습니다.

5 가족, 형제 자매에게 남성형 탈모증이 없는 사람. 남성형 탈모증은 유전적 요인이 크다고 볼 수 있습니다.

6 고령자(65세 이상).

일반적으로 고령자의 경우 바람직하지 않은 증상이 발현하기 쉽습니다.

7 다음 진단을 받은 사람.

갑상선 기능 장애(갑상선 기능 저하증, 갑상선 기능 항진증).
갑상선 질환으로 인한 탈모일 수 있습니다.

2 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 사용을 중지한 후 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

관련 부위	증상
피부	두피의 발진, 발적*, 가려움, 염증, 비듬, 사용 부위의 열감 등
정신신경계	두통, 정신 혼미, 현기증
순환기	가슴 통증, 심박동이 빨라짐
대사계	원인을 알 수 없는 급격한 체중 증가, 손발의 부종

*: 두피가 아닌 곳에 나타날 수도 있습니다.

3 6개월 동안 사용하면서 다음 중 하나라도 개선이 이루어지지 않은 경우 사용을 중지한 후 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

탈모 상태의 정도, 생모 및 연모 발생, 경모 발생, 탈모 정도(굵은 털을 비롯하여 가늘고 짧은 털의 탈모 감소도 개선의 기준이 됩니다).

남성형 탈모증 이외의 탈모증이거나 다른 원인에 의한 탈모일 수 있습니다.

4 사용하기 시작한 지 6개월 이내라도 탈모 상태가 악화되거나 다음과 같은 탈모 증상이 나타나면 사용을 중지한 후 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

두발 이외의 탈모, 반점 형태의 탈모, 급격한 탈모 등.
남성형 탈모증 이외의 탈모증이거나 다른 원인에 의한 탈모일 수 있습니다.

기타 주의사항

1 모발이 성장하려면 시간이 걸립니다. 효과를 확인할 수 있을 때까지 최소 4개월 동안 매일 사용하십시오.

본 약제의 유효성은 4개월 사용 후부터 나타납니다.

2 모발이 성장하는 정도는 개인차가 있으며 본 약제가 누구에게나 효과가 있는 것은 아닙니다.

3 효과를 유지하려면 계속 사용해야 하며, 사용을 중지하면 서서히 원래대로 돌아옵니다.

본 약제는 남성형 탈모증의 원인을 제거하지는 않습니다.

남성형 탈모증의 발모, 육모 및 탈모 진행 예방

본 의약품의 대상이 되는 남성형 탈모증 RIUP X5 CHARGE는 다음과 같은 패턴의 탈모 또는 빈모에 효과적입니다.



※탈모 범위가 이보다 넓은 경우에는 효과가 없을 수 있습니다.

성분 및 분량 100mL중

성분	분량	효능
미녹시딜	5.0g	발모, 육모, 탈모 진행 예방
피리독신염산염	0.05g	과산화물과 비듬 발생을 유발하는 피지의 과도한 분비를 억제하여 두피를 건강하게 유지합니다.
토코페롤 아세테이트	0.08g	피지의 산화 방지 작용 및 혈액순환 촉진 작용을 통해 두피를 건강하게 유지합니다.
L-멘톨	0.3g	두피의 가려움증을 억제하여 청량감을 줍니다.
디펜하드라민염산염	0.1g	두피의 가려움증을 억제하여 두피를 건강하게 유지합니다.
글리시레틴산	0.1g	항염증 작용을 통해 두피를 건강하게 유지합니다.
히노키티올	0.05g	살균 작용을 통해 비듬 발생을 억제하여 두피를 청결하게 유지합니다.
판테놀	1.0g	두피와 모세포에 영양을 공급하여 두피를 건강하게 유지합니다.

첨가물: L-아르기닌, 디부틸 히드록시톨루엔, 글리신, 글리세린, 비타민C, 인산, 에탄올, 1,3-부틸렌 글리콜

성인 남성(20세 이상)이 사용하며 1일 2회, 1회 1mL를 탈모된 두피에 도포하십시오.

사용할 때는 탈모 범위의 크기에 상관없이 1회 1mL 용량은 지켜 주십시오. 1mL는 펌바르면 두피 전체에 충분히 전달되는 양으로 설계되어 있습니다. 용기는 1mL를 계량할 수 있는 형태로 되어 있습니다.


주의사항

- 1 용법 또는 용량 범위보다 많이 사용하거나 자주 사용해도 효과가 올라가진 않습니다. 정해진 용법 및 용량을 반드시 지켜 주십시오. (정해진 것보다 많이 사용해도 효과가 거의 증가하지 않으며 부작용이 발생할 가능성이 높습니다.)
- 2 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 눈에 들어간 경우에는 즉시 물 또는 미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심할 경우 안과 전문의의 진료를 받으십시오.
- 3 약액이 묻은 손으로 눈 점막을 만지면 자극이 되므로 손에 묻은 약액을 깨끗이 씻어내십시오.
- 4 알코올에 녹을 수 있는 것(안경테, 화확 섬유 등)에는 묻지 않도록 하십시오.
- 5 헤어 스타일링 제품 및 헤어 스프레이는 본 약제를 사용한 후에 사용하십시오.
- 6 염모제(컬러 염색, 새치 염색 등)를 사용하는 경우에는 염색을 완전히 마친 후에 본 약제를 사용하십시오.

4단계로 사용하는 용기입니다.

1 캡을 분리하십시오

용기 본체를 **새우고** 캡을 천천히 돌려 분리합니다.




거꾸로 들거나 기울어진 상태에서 캡을 분리하지 마십시오.

(약액이 흘러나오는 원인이 됨)

2 용기를 거꾸로 드십시오

검은색 노즐이 **아래로 향하도록** 용기를 거꾸로 들고 약 3초간 기다립니다. (계량컵에 1mL의 약액이 고입니다.)



천천히 거꾸로 들면 계량컵에 약액이 들어가는 것을 볼 수 있습니다.

※파란색은 약액의 이미지입니다

3 두피에 도포하십시오

먼저 용기 끝을 **두피에 수직으로** 대고 꼭 누릅니다. 그 다음에는 톡톡두드리면서 도포를 반복하십시오(수십 회)




원하는 부위를 중심으로 1cm²2cm 간격으로도포합니다.

(약액이 충분히 퍼져 효과적임)

4 닫으십시오

약액이 더 이상 나오지 않으면 캡을 **단단히** 닫습니다.



캡과 용기 면이 일치할 때까지 닫아 주십시오.

(캡을 단단히 닫지 않으면 다음에 거꾸로 들 때 계량컵에 약액이 고이지 않습니다)

보관 및 취급상의 주의사항

- 1 사용 후에는 캡을 씌우고 직사광선, 고온 또는 차가운 곳을 피해 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 2 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3 오염을 방지하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.
- 4 화기 근처에 두지 마십시오.
- 5 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.