

## センバアプチベリー

第二类医薬品  
乗物酔い薬

◆センバア プチベリーは、乗り物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防・緩和します。旅行や遠出を楽しみたい方や、遠足を楽しみたいお子様にもおすすめです。■3才以上のお子様から大人の方まで服用いただけます。お子様の好きないちご風味の小さなチュアブル錠です。■お出かけ前のあわただしい時や、途中で気分が悪くなった場合にも、水なしでその場ですぐに服用できます。

## 効能・効果

(1)乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和口

## 用法・用量

次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。

乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用してください。

なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回量を4時間以上の間隔をおき服用してください。

1 1才以上、1回2錠、1日2回まで

3～10才、1回1錠、1日2回まで

3才未満、服用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください

錠剤の取り出し方

・図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

・（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

## 成分及び分量

2錠中

クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.66mg

スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.16mg

## 添加物

還元麦芽糖水アメ、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、香料、バニリン、エチルバニリン

## 使用上の注意

## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）

●服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）

## 相談すること

●次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

高齢者。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

次の症状のある人。

排尿困難

次の診断を受けた人。

緑内障

心臓病

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

精神神経系：

頭痛

泌尿器：

排尿困難

その他：

顔のほてり

異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

再生不良性貧血：青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

無顆粒球症：突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

12

### 【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。