

◆仙派 KIDS 糖漿預防並緩解兒童動暈症引起的暈眩、噁心、頭痛症狀，令旅遊或遠行盡興愉快。■專為兒童設計，風味極佳的糖漿藥劑，旅途中感到不適時即可當場服用。

## 療效或效果

(1)預防及緩和因暈車而產生的頭暈、噁心、頭痛

## 用法及用量

請服用以下用量：

為預防動暈症，請於搭乘車船前30分鐘服用1次1枝。

另外，有需要再追加服用時，請1天1枝，每隔4小時以上服用。

3～10歲，1天最多2次，1次1枝（20mL）

未滿3歲者，請勿服用

請務必遵守規定用法、用量。

兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

## 成分及分量

1枝（20mL）中

Chlorpheniramine Maleate 1.3mg

Scopolamine Hydrobromide 0.08mg

## 添加劑

D-Sorbitol ,Acesulfame K,Sucralose ,Sodium benzoate,citric acid,Sodium citrate,flavor

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

●服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。）

### 諮詢事項

●下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

年長者。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

排尿困難

接受過下列診斷的人。

青光眼

心臟病

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

精神神經系統：

頭痛

泌尿器官：

排尿困難

其他：

臉發燙

異常目眩

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。

無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
口乾、嗜睡、便秘、視力模糊

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射的陰涼處保管

請置於兒童無法觸及之處保管。

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。